

全  
幼  
心  
鑑

金匱心鑑卷之三

人參羌活散 治嬰孩小兒寒邪留溫病時疫瘡癰頭痛發熱

熱多睡及治潮熱煩渴痰實咳嗽作驚風

人參 去蘆

羌活 去蘆

柴胡 去蘆

川芎

獨活 去蘆

甘草 炙

枳殼

去蘆 麩炒

茯苓 去皮 各五錢

桔梗 去蘆 炒

前胡

去蘆

地骨皮

天麻 去蘆 各二錢半

驚風加全蝎

去毒 炒

僵蠶 去絲 炒

白附子 炮 各二錢

防風

去蘆 二錢半

痰喘欬加

半夏 麩 二錢

五味子 一錢

桑根白皮

蜜炙 二錢半

發汗加麻黃一錢

荊芥穗二錢半

右為極細末用生薑薄許同煎湯調化食遠服

羌活散

治嬰孩小兒散風邪止驚搐退熱解肌

羌活

甘草

天麻生

茯苓

川芎各二錢

荊芥穗

白薑炒

白朮

白附子炮各一錢

枳椇二錢半

防風一錢半

全蠍去刺炒半錢

朱砂半錢

天南星一字炮熟

右為極細末用薄荷煎湯傷風鼻塞流涕急白煎湯咳嗽

氣促桑白皮煎湯調化食遠服

人參敗毒散

治嬰孩小兒傷寒時氣頭項強壯寒身

肺煩痰寒喘咳嗽鼻塞嚴重風痰嘔噦寒熱

人參

去蘆

柴胡

去蘆

甘草炙

枳殼

去穢熱炒

前胡

去蘆

羌活

去蘆

獨活

去蘆

右以咀用生薑三片薄荷少許同煎不拘時候寒多則熱服

參蘇飲

治嬰孩小兒感冒發熱頭痛痰嗽咳嗽氣喘無驚

人參

去蘆

紫蘇葉

葛根

半夏麴

前胡

去蘆

茯苓

去皮

枳殼

去穢熱炒

桔梗

去蘆炒

甘草炙

陳皮

去白

右以咀用生薑三片煎不拘時候服

惺惺散 治嬰孩小兒傷寒風熱發熱瘧疾時氣重痛壯熱目

澀多睡咳嗽喘急鼻塞清涕

人參 去蘆

天花粉

細辛 去葉

白朮

茯苓 去皮

甘草 炙

桔梗

去蘆各五錢

加枳殼

去穢楚炒防風去蘆

右為極細末用土薑薄荷同煎湯調化食後服

惺惺散

治嬰孩小兒傷寒鼻塞發熱驚悸頭痛咳嗽時行瘧

痘凡寒熱不問傷風風熱先與此藥數服往往必愈

人參 去蘆

白朮

茯苓 去皮

甘草 炙

細辛 去葉

桔梗 去蘆炒

加川芎

右藥散用生薑三片薄荷同煎食後服

澤瀉散 治諸同

蒼朮

米泔水浸  
去皮炒

川芎

細辛

去葉

羌活

去蘆

防風

去蘆又節

白芷

桔梗

去蘆炒

茯苓

去皮

瓜樓根

甘草

炙

赤芍藥

炒

麻黃

去節根

荆芥穗

當歸

去蘆

右藥散用生薑三片薄荷同煎食後服

時雨散

治嬰孩小兒春冬傷寒發汗春冬及夏初行極效

蒼朮

米泔水浸去皮炒一兩

甘草

炙

麻黃<sup>上各</sup> 猪牙皂莢<sup>一握</sup>

右以咀用水煎不拘時候服蓋被汗出但是時行寒役時氣腦熱頭疼不止朴硝水調塗頂上

解表散 治嬰孩小兒傷風感冷咳嗽痰喘嘔吐瀉痢驚悸有熱在表者未煎發散

麻黃<sup>上各</sup> 杏仁<sup>去皮尖</sup> 赤茯苓<sup>去皮各五錢</sup>

川芎 防風<sup>去蘆又節</sup> 枳殼<sup>去穢炒</sup>

甘草<sup>半生半炙三錢一分</sup>

右以咀用生薑三片葱白一莖薄荷三葉同煎食遠服

解肌散 治嬰孩小兒傷寒夾驚傷風面赤咬牙身壯熱

人參<sup>主虛一錢</sup> 石膏<sup>煨二錢</sup> 麻黃<sup>上各</sup>

甘草 炙 一錢半 葶藶 炒 二錢 茯苓 法皮半錢

杏仁 去油 二十箇 枳梗 炒

川芎 各一錢半

右為極細末用生薑三片棗一箇土核同煎湯不拘時候服

化服

解肌湯 治證同

人參 去蘆 三錢 川芎 五錢 芍藥 炒 二錢

前胡 去蘆 五錢 羌活 去蘆 五錢 甘草 炙 二錢

加荊芥穗 二錢

右為極細末用生葱薄荷同煎湯調化不拘時候服汗止仍

服羌活散以退餘熱



解肌湯

治證同

羌活去蘆

柴胡去蘆

防風去蘆又節

川芎

葛根

人參去蘆

赤芍藥炒

石膏

黃芩炒

枳殼去穰麩炒

桔梗去蘆炒

甘草炙

天花粉

荆芥穗

地骨皮

半夏麩

蒼朮米泔水浸去皮炒各半錢

薄荷二錢

右為極細末用生薑葱白同煎湯調化食遠服

和解散 治嬰孩小兒四時感冒風邪壯熱煩燥鼻塞清涕驚

悸自汗四肢骨節痠痛瘰癧已發未發

羌活 去蘆

防風 去蘆又箇川芎

人參 去蘆

甘草 炙

升麻 剉

葛根

白汗加白朮

右以咀用生薑三片棗一箇去核同煎不拘時候服

脫申散 治嬰孩小兒傷熱頭目昏沉不思乳食夾驚痰食

寒熱大小便秘泄或赤白煩燥作渴汗多不來積傷泄瀉滿

腹急青黃臍瘦日夜發熱及驚風風傷者驚風各宜筋骨痛

疳氣等熱

柴胡 去蘆

當歸 去蘆

龍膽草 去蘆

知母 各二錢

茯苓 去皮二錢半

人參 去蘆

川芎各二錢

甘草炙四錢

麻黃去節一錢

右為極細末用葱白連鬚寸煎湯調化不拘時候服

清神散

治傷寒無汗咳嗽

熱無時意熱鼻衄痰壅

人參去蘆

桔梗上蘆炒

細辛去葉

甘草炙

白朮

茯苓去皮

天仁粉

右為極細末用薄荷煎湯和氣加棗同煎食遠服退熱如所

風去蘆又頭自熱不退者宜服黃龍湯加羌活

香薷散

治嬰孩小兒傷寒夾食夾驚四時瘧疾瘟疫

香附丁炒

紫蘇葉各

陳皮去白

青皮

五錢

甘草炙

錢小

葛根炒五錢

右以明用生薑三片葱白一莖同煎不拘時服

香葛湯 治嬰孩小兒時氣溫熱頭痛發熱及驚風

葛根 藥 羌活 獨活 升麻 白芷

桔梗 藥 芍藥 甘草

法公 藥 白芷 甘草 炙甘草

右以明用生薑三片葱白一莖同煎不拘時服

五苓散 治嬰孩小兒傷寒白濁及欲飲水而不化水停

胃腹下注瀉瀉小便不利欲吐下利及霍亂吐瀉

發汗後大汗出胃中乾煩煩不得開食得飲水少不與之令

胃和則愈若脈浮小便不利微熱消渴及發汗脈浮數中風發

熱身微多飲水

蓮瀉

白

白

木猪苓

桂

右為極細末用白湯調化食遠服飲水者新汲水調但多服汁出立愈伏暑飲水多心腹脹滿吐瀉者服效小兒吐瀉亦治腫甚效有身熱多渴只服半湯者是肉裏藥服

紅蓮散

治嬰孩小兒夾驚傷寒咳嗽氣急肺熱驚悸利瀉磨

南星

一兩去脂取薑汁浸宿者入乾皂灰

朱砂

水磨

麝香

一字

龍腦

少

天麻

一錢

右為極細末用薄荷煎湯調化食遠服

紅龍散

治嬰孩小兒夾驚驚風頭生小氣睡臥不安及驚風

附熱小兒不通

滑石 一兩五錢 母金沙五錢

礞石二錢

龍腦 半字

麝香 半字

右為極細末用燈薪煎湯調化三歲一

不拘時服

紅桃散

治嬰孩小兒夾驚陽寒頭疼壯

涎成驚悸多氣

虛心煩及治氣壅腦節不通

石膏

寒水石 各二錢

砂水 雅二錢

龍腦

麝香 各半字

右為極細末用燈薪煎湯調化不拘時服

紅綿散

治嬰孩小兒單傷寒及夾驚傷寒

一

麻黃

去節

全蝎

去尾 炒

草生

天麻

白附子炮

天 炒各二錢

大黃

細末煨半日

右咬咀入綿臙脂些子用水同煎不拘時服

紅綿散

治嬰孩小兒夾驚傷寒頭疼肚痛

天麻煨

白附子炮

蝎 去尾毒炒

僵蠶 去背炒

大黃 細末煨

黃 去節

甘草炙

蘇子炒

星 炮七次

右剉散入綿少許用水同煎不拘時服

香蘇散

治嬰孩小兒四時傷寒頭痛發熱

惡寒瘟疫

香附子炒

紫蘇葉各一兩

良 五錢

甘草炙

錢半

右咬咀用生薑二斤連薑葱一盤同煎不拘時候服或為搗

細末服

桂枝湯 治太陽

風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗

自出膏肓惡寒者

發熱惡寒者

桂枝湯

方

芍藥

兩半

甘草炙

兩

右咬咀用生薑

二斤棗二箇去核不拘時候服須臾飲熱粥

一小盞以助藥

乃溫覆令一時許遍身熱熱微似出汗者佳

自西北二方居

八四時行之無不應驗江淮間唯冬及春可

行之自春末及

秋已前桂枝證加黃芩一分謂之陽旦湯夏

至已後有桂枝

知非石膏各五錢加升麻一分證煩人素

虛寒者正用白

芍不在加減也或曰桂枝最難用雖云表不



解肌汗可發汗  
桂枝湯須臾病人常自汗出小便不數手足溫如手足微冷少頃即溫身雖似煩而反增寒始可行之若病  
不可行桂枝湯也  
桂枝湯者不可再與  
麻黃湯 治傷寒  
發熱身痛惡風無汗喘滿又治太陽病  
脈浮緊無汗發熱  
發八九日不解表證仍在此當發其汗服  
藥已微除其人發  
汗身熱劇者必  
衄衄乃解所以然者陽氣重  
故也

麻黃湯

桂枝

桂枝一兩

甘草 炙 五錢

石以咀用水煎

至後須臾知汗  
出錢石膏一兩黃芩一分蓋麻黃湯性熱夏

三月服之有發黃斑出血之失凡傷寒熱病藥性須涼不可太  
溫唯冬及春并病人素虛寒者乃用正方不在加減也

桂枝麻黃各半湯 治太陽病得之八九日如瘧壯發熱惡寒

熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者欲

愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更吐下也面色

反有熱者欲未解也以其不能得小汗出身必痒

桂枝 八錢

芍藥

薑 生

甘草 炙

麻黃 去節各

杏仁

去皮尖十二箇

棗 去核二箇

右剉散用水煎不拘時候服

小青龍湯

治傷寒溫疫表未解惡寒

水停心下乾嘔

熱咳嗽喘急及主肺脹胸滿鼻塞清涕咳逆上氣喘鳴迫塞  
仲景曰治表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或小  
便不利或噎小腹滿喘者

麻黃

去節微利去麻黃加羌活如彈子大炒赤色若  
滿者去麻黃加茯苓一兩若偏  
者去麻黃加杏仁去皮尖三分

赤芍藥

半夏

去臍泡若渴者去  
半夏加枳實根

細辛

去葉

乾薑

炮

甘草炙

桂枝

各七錢半

五味子

五錢

石咬咀用水煎不拘時候服

大青龍湯

治太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而

煩燥者宜用若脈微弱汗出惡風不可服及治傷寒脈浮緩身

不參作重少陰證

麻黃

去節三兩

桂枝

甘草

炙各一兩

杏仁

去皮尖二十箇

桑

去核三箇

薑

生一兩五錢

石膏

如半雞子大

右咬咀用水煎不拘時候服汗出為度

麻黃杏仁湯

治傷寒飲水過度水停心下故喘又水入腎亦

喘喘高者死譫語且視而喘者亦死發汗後不可行桂枝湯汗

出而喘無大熱者

麻黃

去節

杏仁

去皮尖

石膏

各一兩

甘草

炙五錢

右咬咀用水煎不拘時候服太陽病下之微喘表未解桂枝

湯加厚朴六錢杏仁去皮

五味子湯 治傷寒喘促肺而厥

人參 去蘆二錢半

五味子 五錢 麥門冬 去心

橘皮 去白

杏仁 去皮小大各二錢半

右以咀用生薑三片棗五箇去核同煎不拘時候服

防己湯 治感冒風濕之氣失於解表流注兩足疼痛至兩膝

浮腫不能屈伸傳成癰疽

防己 去皮

麻黃 去節存根桂各五錢

赤芍藥

蒼朮 米泔水浸炒

赤茯苓 去皮各一兩

甘草 炙七錢半

右以咀用生薑三片葱一莖同煎食前服或入雞白煎服

防已湯 治傷寒喘促及年久喘急

防已二兩

訶子炮去核

麻黃

杏仁

去皮尖麤麤炒各一兩

右咬咀用水煎臨熟入臘茶少許再沸不拘時候服

小承氣湯

治太陽病吐下後發汗而微煩小便數大便堅宜

服陽明病若出汗多而微寒爲外未解無潮熱不可與之若腹

滿不大便可小小與之

大黃

微炒一兩

厚朴

薑製炒五錢

枳實

炙大一箇

右咬咀用水煎食前服陽明病潮熱大便微硬可與大承氣

湯不硬者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法

少與小承氣湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之

若不轉失氣者必頭硬後瘡不可攻之攻之必腹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便硬而少也以下承氣湯和之不轉失氣者已不可攻也夫實則噦言虛則鄭穀者重語也直視譫言喘滿者死下利者亦死發汗多若重發汗者亡陽譫言脉短者死脉和者生傷寒若吐下後不解不大便五六日已上至十餘日日晡時發潮熱不惡寒獨語如見鬼壯若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視脉弦者生濡者死微者但發熱譫言者大承氣湯主之陽明病多汗以津液外出胃中乾燥大便必硬硬則譫語小承氣湯主之若一服利者止後服

大承氣湯 治陽明病不吐而煩者宜服陽明病脉遲雖汗出

不惡寒身重腹滿而喘有潮熱可攻其裏下瀉瀉汗出為大便  
已堅宜服之陽明病其人多汗津液外出口中乾燥大便必堅  
堅者必譫語宜服陽明病發汗有時汗不解腹脹痛宜服陽明  
少陰合病自利脈浮者順清而數者有宿食宜服少陰病口燥  
舌乾宜服少陰病脈細沉數病在裏不可發汗宜服少陰腹滿  
不大便者宜服之

大黃

炒五錢

厚朴

薑製炙

枳實

剉碎沙大一箇

芒硝

五錢

右咬咀用水煎臨熟入芒硝食前服

調胃承氣湯

治傷寒發汗後惡寒虛也不惡寒但熱者實也

當下之傷寒十三日過經譫語者當下之若自利者脈滑而微欲



反和者此爲內實當下之太陽病經十餘日心下溫溫欲吐而  
胃中實大便秘澀微滿微煩當下之太陽病三日發汗不  
解者熱者當下之

大黃 一斤

芒硝 九錢

甘草 炙五錢

右咬咀用水煎食前服

小柴胡湯 治太陽病十日以去脈浮細而嗜卧者外解設  
胃滿腹痛且服傷寒五六日中風往來寒熱胸脇若滿默默不  
欲食心煩喜嘔或胸膈煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬  
或心下悸小便不利或不渴身微熱或咳者宜服血弱氣盡腰  
理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下邪正分爭往來寒熱休  
作有臟腑相連其痛必下邪氣痛下故使嘔也宜服傷寒五六

寸身熱惡風項強脇下滿手足溫而渴宜服傷寒五六日頭汗  
出微惡寒心下滿不欲食大便秘脈細者爲陽微結必有表復  
有裏也脈沉亦在裏也汗出而陽微微惡寒純陰結不得復有外  
證也悉在裏也此爲半在表半在裏也脈雖沉緊不得汗非少陰  
病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也宜服設不  
了得發而解陽明病發潮熱大便秘小便少胸脇滿宜服陽  
明病脇下硬滿不大便而嘔舌上白者宜服陽明中風脈弦浮  
而短氣促腹滿脇下及心下痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜  
臥一身及目悉黃小便難有潮熱而嘔身前後腫痙過十日脈  
續浮宜服傷寒溫疫身熱壯熱頭痛項強腰脊四肢煩渴脇下  
平滿乾嘔逆不能飲食及病差後往來寒熱痙實嘔逆肌身羸

瘦倦怠少力活人書云身熱不渴表有熱小柴胡加桂國氏云  
小柴胡湯治瘧瘧甚驗

柴胡

去蘆二兩

黃芩

炒

人參

去蘆

甘草

炙各七錢半

半夏

去肺泡七次一兩五錢

右以咀用生薑五片棗十箇去核同煎不拘時候服

孫兆吹名雷龍湯治世此瘧盛行患瘧寒不問表裏皆

令服之甚快美此經傷寒雖主數十證其間有二證不可服

有五證甚的當服之必愈不可服者有證一者因渴飲而

嘔二者身不溫熱當以此二證明矣可服者一者身熱

中心逆或嘔逆二者者熱往來三者潮熱四者心煩胸下滿

或渴或不渴五者微嘔六者後更發熱此五證不可服

勿宜便可服之必差餘證候子細詳方證及脈候相方可  
用不可一藥用也世人但知小柴胡湯治傷寒不問何處便  
服之反有所害緣此藥稍寒也唯此五證按而行之庶無失  
也不可不然也本方更有加減法雖不在此五證內用之亦  
效今亦載于此若胸中煩而不嘔去半夏加人參枳實梔子  
一兩腹中痛去黃芩加芍藥二分極有效常時腹痛亦療脇  
下痞硬去黃芩加牡蠣一兩若心悸小便不利去黃芩加茯苓  
一兩若不渴外有微熱去人參加桂枝二分溫覆微汗愈若  
咳去人參棗加五味子七錢乾薑五錢時行無大小皆咳服  
皆愈時上癰瘰癧只依本方食後臨臥服其效亦曰瀉元  
效痢中藥無如此驗蓋痢多因伏暑種解暑藥元傷寒之人

審是者渴不問是何候進數服即解

大柴胡湯

治陽明病外證身熱汗出而不惡寒但惡熱宜服

陽明病脈遲發熱頭眩小便難此欲發痼必小腹痛宜服陽明  
病動下腹滿大便秘而嘔口燥宜服陽明病中風其脈浮大短  
氣心痛鼻乾嗜卧不得汗一身盡重小便難有潮熱而微宜服  
傷寒三日少陽受病口乾燥目眩宜服少陽病脇下堅滿乾嘔  
不食往來寒熱若未吐下其脈沉緊宜服少陰若已吐下發自  
汗譫語者宜服少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩不可  
吐下吐下則悸而驚宜服少陰病惡寒時時自煩不欲厚衣宜  
服少陰病利清水色青者心下必痛口乾燥者宜服傷寒六日  
陽脈虛陰脈弦常腹中急痛宜服傷寒六日下之胸滿煩驚

便不利譫語一身不可轉側且服傷寒發熱汗出不解心下痞  
硬嘔吐不利傷寒十餘日熱仍在裏往來寒熱及陽明病汗出  
譫語腹中滿痛并陽明少陰合病下利脉滑而數傷寒六七日  
日中不了了晴不和無表裏證大便難身微熱七八日脉浮數  
病人煩熱汗出解後又如瘧壯日晡發潮熱脉滑者宜服

柴胡 去蘆二兩 枳實 去穢 黃芩 炒

大黃 紙裹濃 半夏 洗七次 赤芍藥 炒各一兩

右咬咀用生薑五片棗五圓去核同煎食前服

白虎湯 治傷寒脉滑而微厥裏有熱三陽合病腹滿身重  
難以轉側口中不乾譫語遺尿發汗則譫語下之則額上

生汗手足逆冷自汗出宜服之服桂枝湯後大汗出煩渴不解

脉洪大傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時  
時惡寒大渴舌乾燥而煩欲飲水數升傷寒無大熱口乾燥渴  
心煩背微惡寒渴飲水無表裏證者宜白虎湯加人參湯脉  
浮發熱無汗不可服諸亡血不可服活人書曰脉厥而滑裏有  
熱白虎湯加人參廣濟云傷寒以溫熱病脉大洪增寒壯熱煩  
燥欲飲水及夏月傷暑發熱惡寒身熱疼重大渴不止燥煩汗  
出脉細小手足微冷并時疾未經轉瀉胃熱發斑無痘前熱  
天行後餘熱不解但是一切伏熱宜服董氏云小兒瘧痘其證  
未全或未明者與白虎湯如秋冬入春寒未用白虎湯之時但  
加棗葉煎不必拘常法

知母 兩五錢 甘草 五錢

粳米 八錢

右吹咀用水煎不時服加入參五錢方加石膏四兩  
竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣嘔逆欲吐及虛煩似傷  
寒身熱煩燥頭不痛身不疼脉不緊數無治中暑煩渴吐逆脉  
數

淡竹葉半錢 甘草炙五錢 石膏四兩

半夏去麤皮七兩 麥門冬去心二兩 人參上黨五錢

右吹咀用水入粳米煎不時服嘔加生薑一兩五錢

知母麻黃湯治傷寒差後或十數日或半月二十日終不惺  
惺昏沉似失精神言語錯繆又無寒熱醫士或作鬼崇或作風  
疾多治不差朝夕潮熱煩赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘  
毒在心包絡間所致



知母 一兩五錢

麻黃 去節

甘草

赤芍藥

黃芩 各五錢

桂枝 五錢 煮月夜半

右咬咀用水煎不拘時候服令微汗若心煩不得眠欲飲水當少少與之令胃中和即寢未汗再服一法小柴胡湯半黃清心圓尤佳

麻黃黃芩湯

治傷寒無汗頭疼發熱惡寒并天行熱氣生痘

痘瘡不快煩燥昏憤或出瘡痘身疼熱

麻黃

一兩去節黃芩 各五錢

赤芍藥 各五錢

甘草

桂枝 各二錢半

右爲極細末用沸湯調化食後服或作飲子水煎服

以實湯

治傷風傷寒胸滿氣促咳嗽不食多夾痰涎出

枳實 麩炒

赤茯苓

半真

桔梗 七錢

甘草

右以咀用生薑三片煎不拘時候服

水解散 治嬰孩小兒天行時氣瘡冠身腫壯熱頭疼煩渴心

或出尚熱

麻黃

去節一兩

黃芩 炒

桂心

甘草

白芍藥 炒

大黃

紙裹煨各一錢

右為極細末用熟水調化不拘時候服汗出為差或利亦效

此調風實之人三伏中亦宜用若去大黃春月宜用

蕭氏青龍湯

防風

去蘆

羌活

去蘆

川芎

全知必謹

七

荆芥穗

桔梗炒

柴胡

牛蒡子炒

甘草炙

黃芩炒

表汗加麻黃

裏熱加大黃紙裹煨各半錢

右咬咀或為極細末用生薑三片葱白一莖同煎不拘時候服汗透熱輕即散服解肌湯

黃龍湯 治嬰孩小兒傷寒身熱不退

柴胡去蘆

黃芩炒

甘草炙

赤芍藥

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食遠服

蓮奇散 治嬰孩小兒夾驚傷寒頭疼吐熱欬逆鼻塞及時行

瘡痘已發不發

藥毒集

白附子炮

天竺黃

甘草

錢半

麝香

去節

殭蠶

去毒炒各五錢

羌活

去蘆

全蝎

去毒炒各一錢

石為極細末用薄荷煎湯調化或茶清不拘時候服

清解散

治嬰孩小兒感冒風發熱面赤鼻衄涕流及溫壯熱

人參

去蘆

防風

去蘆

天麻煨

前胡

去蘆

茯苓

去皮

桔梗炒

枳殼

去核炒

甘草

錢半

細辛

去葉

柴胡

去蘆各

川芎

二錢

石為極細末用薄荷煎湯調化食遠服

八止散 治嬰孩小兒傷寒壯熱及潮熱積熱斑痧水痘心煩發渴大便不通小便赤澀口舌生瘡

大黃 煨一錢 梔子 去殼 木通 去節

滑石 甘草 炙去節 瞿麥

車前子 炒各二錢半 地膚子 一兩

右剉散用水煎食前服瘡痘中加紫草煎服

小歸命散 治嬰孩小兒傷溫變蒸傷寒潮熱驚熱牙鼻流

清涕咳嗽渾身溫壯咽喉有涎及退驚熱墜涎安神百病不生

人參 去蘆 白朮 茯苓 去皮各九錢

甘草 炙二錢 辰砂 水飛研 龍腦 少

麝香 少

右為極細末用金銀薄

煎湯調化食遠服

大歸命散

治嬰孩小兒

瘧傷寒傷風夾驚傷寒驚潮虛熱

面色紅赤鼻流清涕渾身

紅手足心熱氣微喘嘔牙口氣

溫熱似渴不渴夜卧不安

時殷吟目白微紅

石膏

煨五錢

木

甘草

麻黃

去節

川

芎各五錢

陳皮

去白二錢半

荊芥穗

七錢半

腦少

鮮香少

右為極細末用棗一箇土

核煎湯調化食遠服

溫膽湯

治傷寒病後虛

不得睡胃心膽虛怯驚悸

半夏

去膽

如

實

去各

橘紅

去白一兩五錢

茯苓

去皮

中

草

去四錢

右吹咀用生薑三片棗一箇去核入竹茹一小塊同煎食前服

洗心散 治嬰孩小兒遍身熱頭目硬痛背脊攣攣大熱上衝

口苦唇焦夜卧舌乾咽喉痛痛涕唾稠粘痰壅氣逆乳食不進

心神燥熱眼流眵淚夜傷寒寒四肢沉重無聲不出百骨節痛

大小便不利甚瘡痘疹特行溫疫狂語多渴及治天行驚風

太黃 紙裹煨 甘草 當歸 去脂

赤芍藥 炒 白朮 五錢

麻黃 去節二兩 活人書用二兩

右為極細末用生薑湯同煎湯調化食前服或前服

蜜煎法 治小兒陽明病汗出若發汗小便自利者止為津

液內涓屎中鞭不可攻之當須自欲大便日密煎導而通之若  
上瓜根及猪膽汁皆可爲導

右以蜜不拘多少銅器中微火煎之稍凝如飴糖汁續之勿  
令焦若欲可圓捻作餅如指許長一寸以上當熱時急以令  
兩頭示內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

驚風證

驚風方論

驚者虛怯怔忡氣怯神散痰涎來去宜瀉必青漸生風而未至  
風也驚邪入心則面色紅臉赤楊惕夜啼驚邪入肝則面色青  
俱青眼睛瞋視驚邪入腎則面色黑黑者驚於夜驚邪入脾  
則面色淡白喘急氣急驚邪入脾則嘔吐不食泄瀉多睡面色



淡黃脈觀之虛則散而濡者在數而駛治法鎮驚止痰安神  
定志亦須究其臟受病之處而調理之然有所謂溫驚者所  
謂利驚者所謂涼驚者溫之實者利之熱者涼之是為活法  
臨中驚喘嚴沉者易治嚴沉不經者難痊雖然小兒有病問之  
則幼不能言望之則易驚易喜診之則或惕或動自六歲已下  
黃帝不載其說者以其難也又況驚風一科古無全書則尤為  
難固足以知三證之詳矣

辨驚風證

似是而非若同而異受證非一治法不同此疾之惑人也醫以  
當首明辯而治之

陳氏曰驚風二證驚為急慢慢痺也風自風五臟中風也當

分別治之世有熱極生風而不知風寒暑濕之氣亦能生風也  
醫士每見小兒發搐不辯是否驚風使用蜈蚣腦麝生黃白霜  
輕粉寒涼毒劑多致天傷或成慢候蓋真氣者元陽也如用藥  
性溫則固養元陽用藥性冷則敗傷真氣且用溫涼之劑則無  
過與不及

錢氏曰假令傷風傷寒傷食痧痘變蒸等候亦能發搐所謂假  
搐者是也熱盛生驚受證不同各有現證如傷寒傷風熱盛必  
有傷寒傷風之證但牙關不緊

楊氏曰驚風暴烈惟蜈蚣能截能擒貴乎病藥相當辨認的是  
驚風之證方可用之或一字或半字而止或恐傷風等證假搐  
不可妄投中毒非淺或有誤焉急以桑根白皮蚯蚓為解述之

於醫士戒之

驚邪入五臟

入肝 面目俱青 眼睛鼠視 入心 面紅 腹赤 惕惕夜啼

入脾 嘔吐不食 虛汗多睡 面黃 黃色

入肺 面色淡白 喘急氣乏 入腎 面黑 惡叫 齕牙

其脈 虛則散而濡 實則數而駛

治法 驚風化痰 安神定志 究竟五臟受證 而調理之 有所謂 溫證 利證 涼證 驚者 虛則溫之 實則利之 熱則涼之

驚風熱證

嬰孩小兒 驚風急驚 力搖不可驚擾 但扶持不得擒捉 蓋風氣方盛 恐流入筋脉 或手足拘攣 待踈轉如無虛證 不可妄用

相發熱者多使用麻黃湯者誤也。如大寒之劑下之如  
患痰熱未有痰搗之壯則喘風退熱化痰不可妄用投截驚等  
之劑急驚風脈紅者風熱盛者風熱盛者驚熱者驚積  
青赤相半驚積風熱俱有

### 驚風等證

驚者總名也嬰孩小兒心氣未足智志未定恍惚無定神不守  
舍怯人怕物漸作怖畏怖里之盛已作恐懼恐懼之多乃抱怔  
忡怔忡之久則自惕愕惕懼既有癰瘰已爲斯乃心氣不足而  
生之慚但分輕重爾又有心氣虛弱暴觸作驚更不由漸即便  
面青唇白視之定睛目無所覩聽之聞聲耳無所聞精神頓去  
心智全失及至良久收斂日五臟六腑虛處所受驚風而作疾

已述前議然幼多因吻口不意之乳耗其心氣作驚以漸凡  
小兒因水火所加者悸也自跌撲所致者恐也人物之所觸者  
愕也惕惕不散驚驚悶於胸堂者怔忡也是知積驚難散因其  
不能自化如恐恐悸者蓋皆能知之矣不為積聚之情畏之誠  
常在其中尤以自責偶因端作執其心發驚四證相臨市  
者先發假如雷聲震至響不為  
答者何蓋嚴相應情無所加哭惟有六兒在靜處或神廟中  
心存怖之時忽被無知小兒戲叫鬼來鬼來且果奔走無門驚  
氣入心若不速利其驚氣少以則指甲里塞口舌所受重害不  
可得療理自古及今調理患孩最為難事未嘗憑藥取愈且驚  
風至難也慢驚又難也慢眼候尤難也今竊述調理小兒至難

者證候前後有所不堪察理或古人未傳其意或已著丁集恐  
後人未明者今與詳悉本末開陳利害指於迷途上僅可達原  
有益於學者則次務家治產之夫及仕宦子弟亦當其理勿勿  
陰陽稍有偏側進而扶之不至天橫暇日熟研可而練其良土  
觀足知對老肺腑意不截機亦無餘飾以爲更無其時情  
直欲普濟後嬰孩初生自幼至長有患無致受疾不主權析破  
腹歌笑嬉嬉父母即無憂眉展額慶苦之致怡然服事不勞再  
三快哉哉哉至誠成獲休焉

小兒受病其最危者莫如驚風人皆知有驚風而不知驚之從來  
證非一所且審察蓋小兒之神氣未備氣血壯弱肌膚軟弱藏  
腑未堅在襁抱者愛護如持脫薄之器不令跌震可也若被掀

驚風之旨。凡猛恠詫之物。觸犯小兒。則驚先於心。夫心者神  
之舍。神者靜。若有所觸。必致心神亡散。心神亡散。則四肢搖掣  
而成搐。驚本起於心。而五臟亦有焉。名隨虛實所屬。感而受之  
也。夫肝驚則眼上視。筋脈急。面青。呵欠。搖頭。項古。手足振掉。心  
驚則大啼。斗而神散。壯熱。面赤。睡臥不安。舉動多懼。搐驚入脾  
則不能食。五心煩熱。或在嘔吐。或心懼。啼哭。眠臥不安。驚入肺則  
咳嗽喘急。涎壅喉中。如曳。或驚入腎則面黑。咬牙。齒乳。睡多露  
睛。此五臟之驚也。又有小兒在胎之時。動靜喘息。莫不隨母。母  
有所動。胎必感之。若將理失。且飲食不節。喜怒不常。坐臥當風  
。遇酒房勞。或被驚恐。必傷胎氣。致兒生之後。形骸怯弱。顛倒  
。解額上青筋。壯熱。痰盛。百日之前。一月之內。手足抽掣。身外

直眼身發此胎熱風也愈而後發直絲不絕是名胎熱又有  
小兒邪熱手心經痰涎壅胸膈因驚而感風邪則令心神不定  
身熱壯熱牙關緊急手足搐搦此急驚風也證屬陽又有小兒  
胎氣虛怯或因吐瀉或病後失調脾胃虛弱陽氣不足陰氣暴  
盛手足抽掣發時身熱冷口鼻氣出亦冷昏睡露睛或出冷汗  
此慢驚風也證屬陰又有小兒久患驚風證候乍靜乍發往往  
不安或用取轉之藥稍過致令脾氣虛弱脾氣既衰風痰自生  
故手足抽掣四肢逆冷睡多露睛醒多喜閉此慢脾風也又有  
小兒身熱潮熱且輪鼻尖手足稍冷或發搐者此瘳搐證也又  
有小兒盛夏之月先伏暑而後傷風致身熱潮熱手足搐搦者  
此暑風證也此三證切不可作急驚證醫以上諸證其名雖同



其證各異其藥療亦異可不謹哉

驗驚搐先證

目鮮目眇

目白目青

目斜目闔

目轉目瞪

顰焦顰嘔

顰顰顰輕

咽口弄舌

捲舌露筋

噓氣哽氣

噓氣撮唇

噓乳噓食

忽然定睛

吐涎吐沫

拗頸仰身

搖頭擦面

藏頭畏明

手攣手顫

腳攣不伸

忽掙忽亂

恍惚精神

失張失志

照睡不平

睡中喜笑

困戛齒齟

心煩燥熱

啼哭咬人

面臉青色

或紅或青

伸舒用力

微微作顰

有前證候

是欲發驚

已上諸候不心發驚預防之驅風膏琥珀散更擇對

證藥治之

煩煩見乳 十日便停

吐痰吐食 瀉酸瀉腥 吐瀉多日

滿拍脫形 晝眠默默

夜起頻勤 瘡痂無度 延喘作聲

虛腫藏冷 盜汗骨蒸

諸數失血 諸渴亡津 諸病進退

必成慢驚

已上證候久則心狂 降瀉預防之安神膏琥珀散更撰對

證藥治之

驚氣哽噎

夫因驚則氣亂氣亂則上下不通併於中焦氣壅則痰聚痰聚則不飲故氣結噎哽抑而虛欬此驚之先兆也

驚搐握拳

夫驚搐握拳者有陰陽兩證陰者屈指在內陽者屈指在外陽

奉者順陰奉者逆

驚風搐握拳

男子握拳於外為順於內為逆女子握拳於內為順於外為逆  
又指青紫候也

急驚握拳

急驚欲發先握拳

蓋為胸中有毒涎

陰錯陽差為逆候

男左女右推須痊

目白唇白應少睡

口喎舌卷更驚眠

大忌腹高頭手汗

神昏氣促豈能安

纏發驚風有確拳

指分內外細須言

大指在內外

內陰陽外斯為順

女右左男令搖先

大忌悶涎衝入

人心之內不能安

更將形證重重看

用藥開關雙照面

速與赤心無漏 此  
 龍虎用漏圖 按心手心汗如水

此命端的係九泉

握指於外



又持



握指於內



論忽亡驚搐

凡身軀壯熱舌白唇紅大便堅實或瀉焦黃或吐而發驚搐者不可認為慢驚用溫熱藥則生痰痰燥亦不可認為急驚用涼藥則增吐逆蓋小兒熱盛本欲發為驚又傷乳食因吐發搐此食滯也

驚間發搐

男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證

早晨發搐

因朝熱寅卯辰時身軀壯熱上視手中攣握口内生熱涎項頸急此肝旺當補腎治肝也且補腎地黃丸治肝瀉青圓主之

日午發搐

因朝熱平未時發搐心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動掣此心旺也當補肝治心治心宜導赤散涼經散補肝地黃圓主之

日晚發搐

因朝熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜視身熱似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補脾治心肝補脾宜芩朮黃散治肝瀉青圓治心導赤散主之

夜間發搐

因朝熱亥子丑時不甚搐而吐不穩身熱溫壯目睛緊呬視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不省

本云不當補脾治

心補脾且並散治心導赤散涼驚散主之

傷風後發搐

傷寒後得之口中氣出熱呵欠頻問手足動搖當發散宜太青  
膏主之小兒生本怯者多此病也

傷食後發搐

傷食後發得之身熱溫多唾多睡或吐不思飲食而發搐當先  
定搐搐退宜玉餅子利之後服安神圓

一百日內發搐

真者不過三兩次必死假者發頻不為重真者內生驚癇假者  
外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣  
出熱也治之可發散

驚搐諸因

蓄氣而作搐 結氣而成痼

小兒多驚 驚而風冷之氣 育於喉嚨間 轉於心肺 傳入肝膽 其氣上不能升 下不能降 使津液鬱滯 不得流行 故痰涎壅閉 而作驚也

如腹中氣壅 顛門腫陷 則難愈 治法先至 痰入固元氣元氣盛 則津液行 血氣流轉 自然不搐

風搐源因

土厚則物壯 脾土虛弱肝本盛冷

小兒候服涼藥 鎮心宜導 或用吊藥湯水 繳擦唇口 因此傷動

脾胃或泄瀉或腹脹或腹中氣響



小兒面少血色常無喜笑不看上而視下

小兒頭顱高急頭縫青筋時便青糞

小兒肌癢壯糞如青涕或如凍汁

小兒時時吐乳服糞如便青白沫有時乾乾

已上證候狀嘔吐者必成陰瀉俗謂之慢驚風也

醫患之家不究病之原因不分陰陽表裏又不察色脈虛實要

謂執所生風便餌宜導涼藥因此敗傷真氣搐而不救者多矣

蓋真氣者元陽也其藥性溫則固養元陽冷則敗傷真氣故宜

溫中下氣藥治之

驚風者內蘊食熱動於痰涎其則搐掣變而癇爾治法試導熱

氣利驚定心亦有變熱為寒者以其熱盛得之但服輕劑或不治

亦自愈

陳氏曰小兒驚風一證方書中未嘗分析詳細蓋驚風自風自風當分別而治療之世俗通言熱極生風殊不知寒暑燥濕之極亦能生風凡兒乍搐不察形氣虛實使用牛黃朱砂腦麝之劑以致不救者多矣深可憫念不致天枉之意

小兒熱壯動脈亦發搐者非真搐也如或過劑則變假爲真小兒身寒及張非驚風也投寒涼藥命歿非驚風所傳

證治法

凡身熱壯熱耳輪鼻尖及手足稍冷忽發搐者此非驚風是真搐也其驚搐則諸處皆熱有驚定後熱不退者二三日必出瘡痘再出亦同

麻痘發搐

麻痘發搐者乃熱乘於心心火炎上故目睛上視乃痘瘡欲出之壯必中指冷耳後有紅縷及四臟之證但無痰潮呵欠

噤噴睡中急驚耳大冷眼赤

小兒患麻痘發搐不可下驚熱有熱不可用退熱藥有汗不可止汗或吐不可理吐或下亦不可下

時行瘡痘數日前壯似傷風面臉鮮生熱重涼頭有汗

虛驚虛悸手多牽唇紅身熱時加喘鼻清耳冷口貪眠

目赤黑鑷頻噤噴定知瘡毒有相傳

瘡疹多驚悸時行候一同增寒偏要水發熱又嫌風

目赤雙睛白飽浮兩臉紅嗽涎殷啞嘔呵欠睡朦朧

瘡疔相傳染

時氣若感風

唇乾唇白綠

目赤目微紅

瘡出眉先皺

瘡來鼻不通

皮毛寒發立

熱痘隱其中

時氣行瘡痘

形青面臉鮮

痘前頭有汗

恍惚手多舉

噫噴兼微嗽

嗟呵只愛眠

睡中驚起哭

瘡痘欲相傳

### 驚變痘瘡

孩兒驚搐定

身熱壯如湯

斑疹藏肌肉

身涼出痘瘡

### 瘡痘發搐

身熱心煩燥

驚來耳似冰

指稍俱帶冷

痘出甚分明

### 痘前主驚

痘前無休歇

風生五臟中

面青因腹痛

不爾變驚風

### 問久主驚

呵欠若頻頻

睛斜撮口唇

雖狀驚未發

啼哭動心神

搖頭生驚

搖頭頻擦面

拗脛亦因風

目眦青鮮綻

牽身勢若弓

孩子發驚

孩子發驚時

唇紅汗濕肌

瞪睛雙直視

軀體四肢垂

腹脹頻頻喘

精神漸漸衰

吐涎非易治

爪甲黑難醫

發搐面白

發搐面白眼

中黑



血

身上皮膚

頭汗滿口喉中寒

驚風指黑

驚風指黑爪如煙

手口多垂軟似綿

咬齦多啼無淚下

暫時停息又舉

啼哭無淚

啼哭無淚或無聲

下氣時時又發驚 齒肉粘痰魚口動

瞳人昏暗翳遮睛

痘毒發驚

惡候氣喘者不治

痘後驚來逆 瘡前搐亦危 吐痰真可畏 哽氣不相宜

再發驚風

再吐發驚潮搐

涎流臉目斜 烏青連口鼻 啼哭類如鴉

驚風不語惡候

驚風得病不能言 只被風邪五臟綿 涎滯肺心關氣道

至今聲語不相連

虛陽生風

虛脫變虛風 虛陽必上攻 下焦陰氣盛 中脘食難通

半陰半陽

身熱脈浮精神恍惚或吐瀉不思乳食發搐即是半陰半陽合病身涼脈沉精神倦怠不吐不瀉又能乳食發搐者亦是半陰半陽合病正如傷寒半是表半是裏之義也

退熱疎風

王氏曰驚搐多因感冒風熱及諸熱失表以致熱極生風當先解表退熱

人參羌活散 加麻黃 荆芥穗

惺惺散 加荆芥 防風 去虛又清

小兒胡湯 加枳殼煨熟 防風 麻黃 表汗

大黃 裏熱

青龍湯 解肌湯 加麻黃 主惡寒發熱身同煎

三解散

驚風者則身熱壯熱則驚叫不時 肝風多因吐瀉而得必有 風痰急驚風者只是中外邪也慢驚風者是虛積生胎驚胎熱 之所為也

小兒開聲即掣跳者非驚也乃肺旺不足而神有未安

小兒驚風發搐手足不宜執捉恐風 攔連入經絡廢害肢節

驚風候

小兒非時釣土眼睛上肝風驚



小兒夢中五疳動驚風在筋

小兒白日非時驚風在心肺

小兒夢中非時手足動驚風在脾肝二臟

小兒面色赤非時變色驚風在腎

小兒畏人怕布驚風在脾

小兒非時手足掣人驚風在二焦

小兒非時咬人牙驚風入骨

小兒睡時喉中響痰驚風在肺并胃

小兒夢中吐舌驚風在心

小兒非時喜身上汗出驚風在二焦

小兒非時面上生黑點心肝驚風

小兒五心熱心經受熱

小兒面色青白非時發  
戰驚在脾

唇青眼紅無炙烙齒中  
著一人坐

小兒驚風熱夜啼汗出  
多驚青無乳兩眼慢相

咬乳流涎出脚冷病癰  
疳若逢頭仰視早治莫蹉跎

目白沉沉碧瞳人散  
睛乳時頻齧齒髮際印堂青

見物多憂怕饒啼少  
情出時常不穩此候累因驚

照臉如紫色鴉般青  
睛喉中鳴似鋸連目黑侵唇

眉額時珠汗才關舌  
青急驚如有證休要費精神

咽喉無時赤驚邪各  
中渾身常壯熱氣急口唇紅

喉痛痰頻響腸間結  
不通更無微燥渴早晚發驚風

小兒驚搐積生涎 目腎虛遍身斑 頰赤口乾多發熱

涎風盛發狂言

急驚之候本因涎 積肝心兩所傳 眼赤唇青并手搐

下涎風去是精專

面青呵欠累遭驚 瘰瘰饒啼睡不寧 翻眼面紅頰壯熱

忽然室後是驚人

面中卒中渾身熱 唇赤牙關氣如絕 目翻搐搦喉有痰

此是急驚容易決

搐證雖分急慢驚 亦因氣鬱致昏沉 醫士欲治宜寬氣

氣順之時搐自停

急慢驚風各正兩般 急驚屬熱慢驚寒 脈來急數唇焦燥

臉赤心煩口舌乾目睛上視生眵淚尿赤便堅睡不安

時時手足頻抽搐號驚風此的端

七日從前便發驚喉乾髮緊滿時青但看客上微微汗

兼有涎生怕物驚掌內似桃花赤印堂之上有筋青

醫士子細分別看莫作一般風熱名

未發之時先愛睡睡中吐舌更搖頭面紅亦作毛髮怒然

堅手足渾身亦似鉤吐乳作醒生氣息鼻頭手額汗珠

流速宜表汗通腸藥先取常常瀉不休

多啼急痛更無偏定風宜氣不宜先看眼中微有淚

醫士須識病根源面紫色非為差驚天心中有聚涎

兼有紅筋為痼疾青胎口患須傳

驚風孩兒面色青 盜汗背上冷如冰 陽男左搐無妨事  
女右邊猶可理 若還搐左恐無生  
子心大忌如冰冷汗如 搐在肚膨爲不寧  
驚風之候有多般 顛山根源見易難 夢裏咬牙驚入骨  
乍時眼上病歸肝 夜至曉般方息 面白無青候一般  
前後心煩四肢熱 面紅如火向心觀 夜多盜汗日多困  
氣喘不言邪在肝

急慢驚風總說

急慢驚風小兒發熱 云驚風有陰陽二證因身熱面赤而發  
搐上俱牙關緊硬者陰 證也因吐瀉或只此而不瀉目漸昏面  
色白吐脾虛冷而發 不止其抽搐微目上視手足微動者陰

證也陽證用涼藥陰證用溫藥  
證欲發證定先身親臨此或公  
詳審

急慢驚互變

閻氏云治急慢驚風古人多  
審別之

錢氏云急驚合涼瀉慢驚合溫  
瀉而不愈變為慢驚有慢驚  
者多矣所以古人撰一方一  
有理惜乎當時有失詳注如  
急驚變為慢驚之因

不可一服後  
指此非驚風

藥有性溫性涼不可泛用

此是定法也其間有急驚涼  
而不愈變為急驚互相更  
治急慢驚觀前互變之證其意  
證又互者宜用通治急慢驚藥

急驚變為慢驚者因壯熱驚風過多以致驚風不愈三焦經氣肢冷吐瀉時作瘳癰此急驚變為慢驚也

張氏云急驚不除遂退不延鳴乳潮搐為慢驚

### 慢驚變為急驚之因

慢驚變為急驚者因傷乳食或太過以暖驚藥不愈熱延或舌白唇紅急發驚搐此慢驚變

錢氏云慢驚多因性太溫

熱證者有病愈而致急驚

此急驚變為慢驚者以吐下藥太猛不實昏睡驚搐延喘氣壅

慢驚也

此急驚變為慢驚者以吐下藥太

吐或瀉時作瘳癰醫以溫熱藥回紅目赤大便不通小便赤澀

此急驚也

此急驚也

已上二證五相變氣

醫家之要也

四證八候

四證者驚風痰熱是也八候  
兩手伸縮者十指開合  
身仰向後引者臂若開弓  
已備八候生焉四證既無  
脈病證治顯有條類大抵  
有延蔓之盛療病亦然若  
患有所變之異所謂闔門  
順決此有疾在謹初之意

驚風痰熱四證如何

用藥

內搐弱掣顛反引  
勢如相撲顛者  
目直似怒視者  
堅如有專是藥者  
得痰如之痰  
寬是受驚傷風  
血不可以因  
運流之水不  
可以



小兒有熱熱盛生痰痰厥中  
緊急又盛反張上膺痰涎  
涎壅胃口悶亂不醒纏入中  
凝滯有熱熱而愈者有治  
關而愈者皆是依證用藥  
不可妄治痰病在驚不可立  
不可便治搐治小兒病在驚  
自止病在風風由驚作只可  
須退熱化痰若也有搐須  
若以急急雖治驚痰不化熱  
不退風亦不散痰如何去

驚風生風風盛痰搐又盛牙關  
緊風熱極閉經絡則作搐弱  
脈手足拳攣是諸關緊不通百脈  
而愈者不截風而愈者有化痰通  
口不究竟其所以受病凡病在熱  
治風病在痰不可便治驚病在風  
驚由痰熱得只可退熱化痰其驚  
利驚化痰其風自散病在痰涎急  
截風散驚此乃爲醫士至妙之道  
亦不退驚如何自止化痰其痰熱若  
知不治之治所以治之之謂驚

士深可留心操志於此一端究竟無至得失乃謂之醇金通道而已矣

虎口三關紋紅紫或青皆驚風之壯。

脉浮數洪緊

治法大要用藥有序治病有方法當急以退熱疎風下痰定搐開關當下便不可用巴豆硝銀粉腦麝牛黃大寒之劑下之大黃可也恐傷真氣元陽也小兒易虛易實用溫涼之劑無過與不及亦不問前醫曾經解利不冒又不知真假逆順傷寒傷風麻痘食積變風驚風亦能發搐假搐者是也各有現證可驗牙關不緊者無痰潮見其驚風便言熱則生風便與腦麝巴霜輕粉牛黃蜈蚣大寒毒劑截風峻取下痰以致脾胃虛損以傳慢

候天傷者多矣凡百病不可損其胃氣醫士戒之。

曾經下後諸病猶在不可再下有驚則散驚有熱則退熱有痰則利痰有實則去實實熱退則不生痰驚散則不生風壅實去氣自平病何由作。

錢氏用溫驚圓涼驚圓利驚圓者何也虛則溫之實則利之熱則涼之。

楊氏曰急驚屬陽用藥以涼慢驚屬陰用藥以溫不可以陰陽無別春夏肺氣虛肝木旺當補肺瀉肝秋冬肝木虛肺金旺當瀉肺補肝驚風多因感冒風熱及諸熱失表以致熱則生風見急驚風手足搐搦者以瀉青圓瀉肝圓導赤散降心火二藥合服之身熱不退搐不止者導赤散加黃芩防風煎調服全蝎散。

大便實者加大黃如壯熱痰涎壅盛者利驚圓或生黃奪命散  
加麝粉一字用蜜煎水調服利後神志未寧至聖保命丹安  
神圓至神實至神起心圓用沙糖煎湯研化食後服

假令神志未定是志化痰利驚先驚熱出於心則須從小便  
利之用清寧散用薑黃同煎微熱不退溫膽湯用竹茹生薑  
棗同煎服痰嗽者抱龍圓皆驅風化痰之藥

假令肝有風熱身必反張性急而不省心不受熱也當補腎治  
肝服補腎地黃圓治肝驚青圓治心驚以調理脾胃進食藥不  
可用寒涼之劑經曰熱則為之寒則溫之

假令驚風已退神志未定至聖保命丹定志安神化痰利驚安靜之  
後二三日復發急須調治至聖保命丹至聖保命丹既定後知是搐不

去痰最速便以爲要矣永樂後得是過街之證

寶鑑

楊氏曰：諸風皆由痰壅六通皆由痰塞中脫留滯口動所致痰之壅塞者氣實使之治風痰當用半夏南星全蝎僵蠶等亦當用蘇合香圓同青壯白圓子用薄荷煎湯調入生薑汁灌服蓋便氣下則痰下則風散自通若搖鼻不嚏者不治

救牛散

諸牙白三角炮

天南星

去麋生

半夏

去麋生

川烏

土尖炮

草烏

炮少

天麻

去麋生

羌活

土麋

荆芥穗

防風

去麋生

僵蠶

土麋炒

細辛

去葉

全蝎

去麋炒

薄荷少

右為極細末入麝香一字雄黃同研拌勻搐鼻用竹管盛吹入鼻中開關用生薑汁調擦牙

聖散子

赤足蜈蚣

一條中分作二片用葱汁浸一夕焙

全蝎

頭尾全者十四箇分作二片

二味各記左右為極細末各分作左右各貼左眼左手搐者用左藥搐右眼右手搐者用右藥搐雙搐者俱用

驚風後失音

楊氏曰咽喉為氣之道路風傷其氣故掩閉聲音道路之門亦有血滯於心心竅不通不能言也可服

肥兒圓

治嬰孩小兒風後瘡不能言

燕美炒

神麴炒

麥蘖炒

黃連

去鬚各一錢

石為極細末用猪膽汁糊圓如黍米大用木通去節煎湯食

遠服黃連能去心竅惡血

木通湯

治嬰孩小兒諸風失音

木通

去節

石昌蒲

防風

去蘆節又

桑螵蛸

全蝎

去毒炒

僵蠶

去背炒

甘草

炙二錢半

天南星

炮五錢

右剉散用生薑二片紫蘇三葉同煎食前服大便不通加枳

殼

炙杏仁去皮

通關散

治嬰孩小兒驚風並退只是殼症不能言

天南星 去反膽一箇炮

右為極細末每服半字或一字三服 麝香錢用酒送下

前調服藥入喉中便能言語

二聖散 治嬰孩小兒風痰壅閉噤口不出氣促喘急

症似搐

訶子 大者半炮 大腹皮 各五錢

右咬咀用水煎不拘時候服

治驚風後瞳人不正

阿膠 炒 人參 去蘆片一錢

右咬咀用水煎食前服

假令夏間伏暑毒得驚風者名曰驚風如慢驚相似不搖眼閉

本知心藥

中



昏睡不醒身熱頭痛便不可投藥  
服五苓散加羌活全蝎寧心加  
驚風定抱龍丸尤妙也

### 驚風肝絕

身熱頭旋不舉頭目黃眼流  
四肢逆冷痛咽喉休道傷寒因  
何如命盡黃泉下脉亂洪浮  
鉤

### 驚邪死證

有似驚邪不羈抽搐獨時時動  
唇青口黑吐涎流冷熱相潮時  
此是胃弱鬼神患求神服藥不  
效

驚風死證

忽作鴉散 黑瞳浮散 噎氣不通 長舌音絕 額汗作珠  
口開唇縮 睜睛不轉 兩臉如朱 鼻紅乾黑 腹中虛鳴  
疾如膠黑 手足丁直

急慢驚風雜病不治證

眼陷無光 白睛灌人 爪甲青黑 四肢垂痺 牙關緊閉  
面赤如緋 面青皆冷 頭目仰後 足冷目青 腹肚胸高  
手掣胸膈 唇舌鼻黑 魚口氣羸 鰓腫鰓陷 啼哭無淚  
冷肝不止 汗出如珠 如油眼青 瀉黑悶痰 入心肺喉  
舌出虛口 齧乳齧人 五硬五軟 五冷五乾 吐出不定  
泄瀉不止 面精神好 煩渴不止 止而又渴 吹鼻不噴

病重口乾 不睡時氣 唇上青黑 點頰深赤 如金麝脂  
鼻數開張 喘急不定 俱是死證 病逆不治

驚風不治證

瓜甲黑是肝絕 瀉黑血是心絕 吐止又吐是胃絕 久瀉  
住又瀉是脾絕 兩目不開不合忽作強盛是肺絕 口吐白  
沫是腎絕

驚風變作死候

驚風瓜甲黑主肝肝絕亦為血絕十無一存

瀉黑血則心絕心乃五臟之主主絕只得一日而死

目多盜汗汗主氣氣絕故令汗出不止數日而死

忽作強盛為肺絕其證只有出而不迴三日必死

厥人是骨絕主齒牙咬妳從裏湧出則遂亡日死  
眼半開半合黑瞳無光無目腎絕四日死  
口鼻乾黑脾絕無津液兩日而死寅卯時  
病極眼下青筋出及青色起死  
鼻頭粟米粒聚出

下藥不得口中有涎粘塞

頭軀向後及腦開或腦腫起

項筋舒展無力手足垂而不知收

汗出如油不流及指甲青黑

口大生瘡頭黑者是風熱毒氣入臟

喉中作噓歔長短及凡心凹

目內生赤脈上侵瞳人

患此者氣衝心口如魚咬

目者此視風雜膽著死

病似瘧疾發無度發來瘵齒作聲名鎖腸疰死

病極瀉痢如鷄鴨血者是脾敗

諸風肚緊手脚硬目直大

諸病口下唇搖漏水者死

病極視脚心不知痛者死

齒齒搖頭變髮禁脤高心陷喘氣

面青多困目不開手足如冰

目黑入散量屢量舌拘黑





則無聲逆則有聲肝風心火二經受毒故發搐也血亂氣痰  
延壅盛百脉凝滯聞聲不醒風氣壅盛而無所泄暴烈而成急  
驚也

### 急驚風候

醫云陽明也手足搐搦延朝不醒醫家下之其所用藥性性和  
以輕粉或水銀曰三寶有毒性既已甦醒之後精神由尚昏沉  
未快乳食者或有餘熱其候欲得安痊和平只可用平穩藥調  
胃氣不可直使與服燥烈藥若與服之其候復作何可抵耶  
因聞大驚或大驚而發搐發過則如故此無陰也當下利驚間  
主之小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大  
小便黃赤劇則搐也蓋熱甚則心火風屬肝此陽盛陰虛也故



利驚圓主之以除其痰熱不可與巴豆及溫藥大下之恐搐風  
熱不消也熱痰客於心胃因聞聲非常則動而驚搐矣若熱極  
雖不因聞聲及驚亦自發驚

急驚風證候上驚反張搐搦口流涎涎壯熱併有之其或有視

左視右者有僵有仆僵即也屬陽拳握指有瘰有外醫分男女

左陰陽順逆之理有左右引搐連及腳至身肢顫動初則搐搦

俱作久而搐住口撮有急有緩但口肩動久瘰癧瘰癧者候之

輕也搐則盛也搐又重也反張牙關緊急喉中有涎即是驚風

候如牙關不緊口無痰涎口反張搐搦上驚者未可使作驚風

候至夾驚夾食傷寒瘧症或三焦蘊熱五臟之火流入經絡

在筋脉亦作搐搦錢氏搐有真假不主病也重者云急驚重者

分數者是約熱之輕重而與利之

急驚若是證候氣逆起潮上證候發熱不止食飲不化煩躁  
促唇口眉眼眼眦引連併俗語云急驚風發熱發熱發熱發熱  
是說治之有法輕重調治

急驚先當定搐搐由風也風由熱也熱由驚也作方曰下驚風  
熱若不退驚亦不敢不移其時搖擺大作所謂過街候乃是臨  
家不關纔見搐定便言安樂僕謂急驚風難治有三只有初驚  
時其風癇發作出的輕重去風定搐隨風而動之斯是驚風或常  
人執是妄便下之既下了諸證候皆在者一難治也又其是正搐  
親人一向執扶不令搐指其風癇不得解者進入經絡藥力不  
及雖病減癯根在血脉或汗癯落一難治也又其兒虛弱有順

有逆順即易理逆即難解惟是病延既久不得良創論候傳授  
越去元由而作他語者三難治也

急驚風候用藥非謂難也專治急驚風候其法度不難不傳  
次第下藥無不愈之理多是病家倉皇不識事候信手山野庸  
鄙之言病候延久不無傳變傳即證重變候延久經二三醫  
醫藥不效兒受困苦無能文藥主之者必大發證一日兒病  
證候危惡變急臨時以何方對治急驚風候口勢發重者  
藥下關端的一向攻緊信手具識淺陋者不超有誤得失用  
藥不及則無妨事可以療理甚也太過即時害生

療嬰孩豈可以藥有候投之太過或不及由尚不可不避謹候  
乃為杜究兒童雖分長幼有患臟腑皆令怯弱易冷易熱易虛

易言若攻之相重其不任彼滋孰言疾不瘳反爲它害曷不謹  
歟今者急慢驚風及慢脾風等藥卽是老夫指準應備緩急至  
要則效之者不待更較可少之理

驚風痰熱已論在前且驚與風其痰與熱各自有本證候受病  
急風爲疾四者併聚有驚有風有痰有熱或因驚而有風生痰  
作熱或有熱而作驚成風生痰或積痰而發熱熱盛生驚變風  
或又有風候痰涎常有因驚而發熱調理更難者形證  
一不可有善明脈醫士於暴作者亦當知之其驚微風退熱化  
痰又盛二者醫風散熱痰涎鎮驚四證相須藥宜併理古人處  
方亦合此意然學醫者不可不究其源遠若見候將作尋常甲  
万輕忽病無少安證傳它候不逆且惡禍不旋踵

嬰孩急驚風候便須先審察四證四證之中而作八候八候者

一搐二搦三掣四顫五反六引七竄八視一搐者臂肘搐縮二

搦者十指開合搦之不已即成握拳男者大姆指其指握在外

爲順在裏爲逆女反看之三掣者肩頭搐掣或連身跳起四顫

者或手或脚或頭或身四躡顫動五反者身首反張六引者以

手有如挽弓狀男左手直右曲爲順右直左曲爲逆女反看之

七竄者眼上竄覷高男上竄爲順下竄爲逆女反看之八視者

男斜目視左爲順視右爲逆女反看之既有四證八候次第隨

生若只去得驚風且痰熱不散未可言安痰與熱聚將來必致

痼疾所治之法其痰與熱須察之可下即下痰熱既下驚風未

盡消去則病依前又有發作所言四證相須不可留一若理得

驚風已定隨便下了痰熱且驚風不復有作此理至為妙也  
嬰孩有患在痰熱未有驚風者只可退熱他後不宜妄投驚風  
藥何也驚風之藥其味多寒涼經絡本自無事稍有攻發透其  
痰熱入於經絡却成風痰之疾搐搦致之

嬰孩五臟經絡虛即生風既虛所受日驚亦然而有作驚風有  
作八候次第而生所謂兒無病不可與服攻發所治之藥  
嬰孩驚風發作有八人有壯弱有淺深但輕重大者加分劑重  
者多與服數乃合其理

嬰孩間響即掣跳者乃肝肺不足魂魄不穩故神有不安即聞  
響掣跳者非謂驚也犀角地黃圓主之又兒心氣虛怯神不安  
定連併掣跳者宜四君子湯加辰砂脾胃氣壯神魂俱清自然

不恐

嬰孩欲發驚風候先神不定顛左復右觀上及下或已定其睛  
疑其神恍恍惚忽怕物懼人不若當日嬉戲者急常療之如有  
熱先退熱有驚散驚熱退不主痰驚散不作風良久自然安定  
神情和悅氣脉舒暢若待風變而發驚癇盛而退熱事由至緩  
不若四證俱全由可治療

嬰孩急驚風發搐手足不可執提及以手用力灸之即傷經路  
經絡既傷亦無所益則癰肢害身

急驚風候有大有小有輕有重有順有逆有偏有正詳審久暴  
次第進藥且病家無不倉惶驚心醫士須是正定無自昏惑  
急驚即日用醫其驚氣和平方可調理若以急驚之謂調理事

致絲毫慢醫建此消息

醫急驚初用在我則我既證候遵法度衆傳變衆緩以治之切不可信病家及左右人說其所欲調順人情有爭得失治在我豈可妄信致之差謬罪累誰服

急驚初無痰而後痰盛初有搐而後不搐者此證所傳候之至盛人少知之蓋由初醫縱次病家不謹經三五家用藥或庸士所見不同有大過不及之害如此則不謹歟

醫急驚須量輕重下之得其宜良且驚風類去痰熱已也不

作後患所下之藥稍多已霜賦粉爲重即傳慢候無煩

急驚欲下之理須在急驚上竄斜視反張所作之時可下若傳過或已搐定少緩之間未可直便緊下有乎得失



急驚用藥先與服截風定搐次與下熱藥去則無風風最明不  
搐是知以藥之功在我意設不至悉妄為到此顯功方知難  
易

急驚有上竄者有搐有搦有引有反有僵有仆有叫者有淚者  
有痰涎潮盛有溫壯發作各隨四證輕重而受之急驚截風定  
搐為要風搐既定諸證漸息定搐消用通關非搐息之謂通截  
風乃為調絡

定上竄者左視乃於男女之順候忽反是則逆也大抵逆則難  
治順易理不以逆證候為不可治古人言難治謂陰陽相攻  
候垂危須用審究其證詳審其候以盡力救之取效而後  
者為之奈何

急慢驚風候者言之失意為  
神乃陽病慢驚為陰病正恐  
作陰治陰反陽豈一藥以合  
明證又云治陰陽一證傷寒之說  
能曉此理可謂通變

急驚候至為要緊急在於片  
時之間若或差殊更有得失一時  
所見見其端始用藥無疑法  
在疑情未須投藥發無疑其意  
靜善疑在未發藥之前良  
妙矣

急驚頭額心背元被灸了  
只決定發痛不可治藥後嘗謂風癩  
可灸驚熱不可灸蓋風與  
痰涎癰盛胃氣胸膈呈昏亂迷悶不  
能醒知心如所失既灸着  
此痰化心開即漸安愈驚之與熱心  
神常存間知被灸忽痛不  
能驚悸轉感其疾差重所以用艾在  
先藥必未有益

驚風未愈未嘗見因灸工活每見老嫗婦無術以艾炷兒生三五日之間便以艾炷之不惟失元因痛增悖經絡未全如何愈病智者消詳不可不究

急驚風吼叫二兩聲者難治心受驚觸痛絕于內乃傷其根本之謂

急驚風未投藥四證俱全已服藥四肢垂痺者難治

急驚風藥者難治又藥下者亦難治

急驚風搐搦之後四軀俱麻者難治

急驚風發作之後脚作攣屈者難治

急驚風抽搐目睛翻轉者難治

驚風搐搦已住神情緩慢手尋娘衣或尋自身軀者亦不可治

驚風諸證候盡皆已住但神情呆慢氣促者不治

驚風證候已住見打物不捨情狀緩緩於中此謂十全必有再發之理如或再發不可治

急驚風鼻中出血者易治口中出血者難治鼻中出血者其熱已散故易治口中出血者心火妄行故難治

驚風尿尿已遺者難治大小便閉者易治

### 慢驚慢脾風證

緊口曰慢驚者陰證也因吐瀉病久脾胃虛損似搐而不似搐亦名痰涎脈有力用宣風散導之後用益黃散平之天麻防風

圓亦可

小兒慢驚慢脾得大病之後或轉慢取急驚峻下以致脾胃虛

損風邪乘之似搐而不甚搐似睡而精神昏漫四肢與口宇氣皆冷臍則露睛或胃積而啼哭如鴉聲此證危急蓋脾胃虛損故也受證不等故難治也急驚用涼藥或取下太過轉成吐痢不止而得或氣虛暴吐瀉而成有臟腑虛洞泄成者風邪入於腸胃大便不禁而得有久利虛脫成者有傷寒傳變日久而成者有久嗽成癰者有下積峻取而成者有發癰不已而得者有蟲積沖心者有卵腫疝氣腹痛者有晝夜盜汗脾困多睡煩燥引飲四肢浮腫大小便秘結丹瘤腫毒龍帶纏腰走馬急疳皆傳慢候吐瀉積痢成虛則變證甚速

治病不同受證非一審問病源準較陰陽虧盛淺深何如便不可用溫藥燥烈大熱之劑可用生胃生津建脾驅風之藥治其

候音  
病音

陰氣易盛陽氣易微。驚本無熱。虛熱者是也。蓋脾胃虛損發熱。痰盛六脈浮洪。虛熱虛痰上攻。因候引氣。雖大痰響聲如拽鋸。是謂陰盛強陽也。亦無汗下之理。一時不識。錯認爲陽氣。陽氣已復。覆燈將滅。用藥下痰。痰隨氣下。氣隨痰絕。驚殺之。兩用阮氏白圓。十四聖散。驚風化痰之藥。青州白圓子。合金液丹。二藥等分。搗礞羅極細末。煮麵糊爲圓。如黍米大。二三十圓。用生薑煎湯。或遠服。日進二服。瀉痢不止。微搔者。烏蛇四君子湯。生薑薑黃同煎。食前服。研至聖奪命丹。有陽證者。太一保生丹。脾胃虛寒不止。至蠟觀音散。實脾散。大醒脾散。皆可服。寒極無陽氣者。理中湯。加附子。回陽服。四君子湯。加乾薑。丁香。木香。生薑。棗同煎。食前服。調中湯。治之。無他證。調理脾胃。藥治之。慢驚風之

候或吐或瀉、涎鳴微喘、眼開神緩、睡則露睛、驚跳搐搦、乍發乍  
靜、或身熱或身冷、或四肢熱或口鼻冷氣、面色灰白、淡青、眉唇  
間或青黯、其脉沉遲散緩、蓋由急驚過用寒涼、或轉大驚、傳變  
成之。又有吐痢不止而成者、有氣虛暴吐瀉而成者、有夏月脾  
胃伏熱、大吐瀉、當解暑熱、不可專曰因陽、有臟虛洞洩、成者、有  
久痢氣脫而成者、有下積取瀉、成者、有吐血瀉、成者、有傷  
寒傳變陰證、成者、有得之久嗽、作痢者、有得之發熱不已者、有  
得之蟲積衝心者、有得之卵腫、疝氣、腹痛、其或汗出太過、脾固  
煩渴、四肢浮腫、大小便閉、走馬急疳、亦傳慢慢候、惟吐瀉積痢、成  
虛致之、則證變甚速、凡纔吐瀉、便是慢慢驚、須用溫中快裏、或搐  
來緊急、乃慢慢驚、初傳尚有陽證、不可誤作急驚、用藥、世二、搐慢

醫家  
當細  
辨之

爲慢驚非也。若此此往往指慢脾爲慢驚矣。凡慢驚男子以瀉  
得之爲重。女子以吐得之爲重。古人云病家怕驚不怕瀉。醫家  
怕瀉不怕驚。如因洩瀉久患不止。且先治瀉。若更治風則驚風  
愈甚。如因他證例當循原施治也。其慢驚候若從急驚傳來。只  
可散風調胃。均平陰陽。不可全用陽藥。使陽歸陽。復作急驚之  
候。用藥施治無過不及可也。急驚以關格不通。裏施。腦鬱。開通  
定其搐搦。尚可慢驚陰重。陽虛。諸經已虛。不宜通關。又涼其臟  
易作慢脾。風慢驚危急。如眼睛昏定。定而不眨。雖眨不左右顧。  
或窺視。四肢厥冷。汗出如流。口面黧黯。指甲黑。四肢垂。重  
慢驚證。眼半開。半合。似睡不睡。是也。其脈或浮或沉。身或熱或  
涼。或吐或瀉。或不吐瀉。或食乳或阻乳。名半陰半陽。合病如傷。



寒主表半裏也。治法大要審問源流施治不可一槩曰慢驚證  
如因吐瀉得之用醒脾散之類他證可以類求推次第子後然  
慢驚已傳屬陰亦須準較陰陽虧盛淺深不可溫燥之劑大過  
慢脾風之候面青額汗舌短頭低眼合不開脛中掣頭歪舌頻  
嘔醒鼻塞口咬牙手足微搐而不收或身冷身溫而四肢冷其  
脈沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損  
脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可  
逐若瘳驚則無驚可瘳但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困  
氣之神志沉迷痰涎凝滯然爾世所謂慢風難療者慢脾風是  
也然慢脾一名虛風或吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因  
虛而發熱繼此必得慢脾風纔見掣頭斜視以手摸人昏困喜

脾領上汴多身亦枯其體

小而焦即是脾虛之證不必皆

由急慢風傳火而至又當識

又慢脾之後言脾而不言胃何

也蓋胃為脾屬陽非若脾乃陰

臟也故小兒病傳在脾多自愈

在脾不可不治蓋小兒純陽之

氣在脾其順在脾其逆古人皆

理其臟未言治腑也又腎一臟

常主虛不可攻也若腎虛有虛

但清心脾緣心與腎即既齊

而與腎及子母也無與者藥及

諸補藥也慢脾惟吐瀉瀉積阻

痢傳入慢候其症變至虛虛又

東也治法大要主胃也陽若眼

半開半合手足不冷證候尚

過劇也治法大要主胃也陽若

眼半開半合手足不冷證候尚

在慢驚則勿用回陽或已入慢

脾而陽氣不甚脫者亦未可即

用硫黃附子等劑手足漸暖仍以

醒脾散等調之慢脾風用藥

乃非得已也。若如燈無油漸見滅。

### 慢驚風候

楊氏曰慢驚之證或因急驚過用涼藥或取下太過傳變而成或吐瀉不止而得或氣虛暴吐痢而成有臟腑虛洞世或有風邪入於腸胃故大便不禁而痢又有久痢胃氣虛脫成者有傷寒傳變陰證而成者有得之久嗽成痢者有下積暖取而成者有吐血瀉血而成者有感風不解候藥成者有得之發癰不已者有得之蟲蟻損中心者有卵腫疳氣腹痛得之者有日夜盜汗脾困多睡煩燥引飲四肢浮腫大小便秘丹瘤腫毒龍帶纏腰走馬急疳皆傳慢候惟吐瀉積疳成虛治之則變證甚速柳叔舉曰急驚吐痢服涼藥太過虛胃虛弱乳食不化則難救

仲景云陰不得有汗蓋陰證無汗有汗者亡陽古人說慢驚  
疑是也似搐不搐其間亦有慢驚如急搐者是死期之速也凡  
慢驚有汗多死

小兒因病後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時  
痲瘳昏睡睡露睛此無陽也急慢驚陰陽異證切宜辯而治之  
急驚合涼瀉慢驚合溫補世間俗方多不分別誤小兒甚多小  
兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼藥治之  
又不能已謂之本傷風醫亂攻之因脾氣即虛內不能散外不  
能解至十餘日其證多睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚而  
爲瀉當去脾間風風去則利止宜風散主之後史君子圓補其  
胃亦有諸吐痢久不差者脾虛生風而成慢驚

古云陰瀉也良由急驚用寒涼之藥太過轉動深重乃傳作慢驚或因風食二瀉不治而變或慢驚或因咳嗽下痰轉虛而成慢驚因由甚衆槩而舉之病家怕驚不怕瀉醫士恐瀉不怕驚其瀉不止則驚風愈盛若唯治驚更用寒涼之藥且瀉轉多則進重矣

慢驚曰陰瀉

失慢驚雖曰陰瀉實因二種而得二種者或只吐或只瀉或吐瀉俱發亦因風驚食所化是也

慢驚之因

慢驚者因久吐而胃氣先虛胃與肺母子也母虛亦令子畏二經虛則生結痰者皆自所出也痰則凝滯在於咽喉如牽鋸之

般時復瘰癧是也

所以慢驚氣眼偏黃者胃氣虛生風通其子土風能動能開

慢脾之因

慢脾者因久瀉而脾氣先虛脾氣虛則子母也母虛亦令子衰二經俱虛則生涎涎壅延者脾肺所出也涎則溢流在於咽喉如

水雞之般時多瘰癧是也

所以慢脾眼偏黃者胃氣虛入脾通其子土氣能靜能開

陰瀉之因

陰瀉者吐瀉之久脾胃俱虛腹中自表裏也二經俱虛則主痰頑涎相纏如膠塞於咽喉故嚴肅王而喘時復手足顫搖或如角弓之反張是也

所以陰翳眼半開半閉者是風氣併行脾胃飛仙論云陰翳眼似睡不睡王氏云驚風眼半開半合

已上三證似同而異並屬陰也各日晴皆量脊脊強直或作鴉殼發頻難差皆亡死一生也

小兒或吐或瀉痰鳴微喘眼開神慢睡則露睛驚跳搐搦下發乍靜或身熱或身冷或四肢虛熱或口鼻氣逆或淡白瀉青眉間唇間或青或黯里脊睡迷問其脉沉遲微緩

小兒慢驚風候若是急驚傳來而面陽赤目陽即止不必回陽又不特治陽只可截風調胃均正陰陽可治可執可緩可急是也若直便與服附子硫黃之屬使陽歸陽又是急驚學者理宜知之既知陽證傳作陰證服保命丹一二服無上苗清心圓其

有四證且八候稍緩疾成陰癰者服之若以傳過八候不作四證尚在只其甚者服定命飲子若厥手冰冷者乃四逆候乃可回陽次第照合者即傳作慢脾風候其兒驚風痰涎壅盛搖搦不止不可下

嬰孩所受此等證候別無他疑者只依下項用藥無不姓醒切不可延久其陽易化陰氣漸盛藥力不及使人難治又不可一向連併投藥每次一二服了須審察證候緩緊自應傳變稍覺寬定其藥放慢或勢漸緊宜以次漸漸急藥與脈不可離端一藥又不可便換湯餌速併與之所謂察其脈息審其進止而後已今著妙方不勞檢閱脗合如法對證投治效萬一  
小兒慢驚若是急驚傳來是知前人不曾截風定搐陽脫而傳



陰陰重陽虧其風與熱隨流縱入經絡又有胃服太寒涼之藥  
過多又有下積取瀉致作又有臟腑虛寒洞洩而為其所受多  
端已載前篇

小兒慢驚當知陰癇之說其證屬陰臟寒氣厥或而泄瀉不止  
且驚正作多因無識之人一向治驚更不理瀉藥用寒涼投之  
今氣愈虛洩瀉不止陰證愈重驚搐愈增止瀉止瀉變積熱入  
候復加四證不退慢驚雖曰難活蓋醫亦不當竟謂作如進  
深為重害

醫慢驚不可爭攻急驚陽癇稍易理慢驚陰證  
愈而尚虛乏未醒三五日之間者有之俗謂過往  
不可輕易妄劑投之攻擊則前功俱喪

受毒所治之理須究問元由所發若  
陽明所作陰虛也當察陽證未純其陰  
而作慢驚者男兒爲重如因吐逆而作慢  
驚者女子爲重即  
腹而陰虛小兒有長幼之別臟腑有虛實之分有瀉三五次便  
成風候乃由虛之盛也或有二三日卅方成風候或有五七日  
瀉不止而成風候暴瀉成風由可速治蓋同陽調中補氣之爲  
易若久瀉漸傳成風候者爲虛瀉之以難理按  
慢驚證候所以用藥不一治瘳不等如發作不同故述在前雖  
則四者之議猶爲大槩智者得之闕  
敘詳其輕重可否之意而  
施設之

醫理慢驚之候其意在慢治急瀉之候其意在急何也且急無

過因熱生風作驚跌撲作驚他物觸之作驚驚熱傳極即發生  
風搖搐等候皆熱所乘者也順證治法下之諸候自息然慢驚  
所作不常當宜省察用意予細所察故宜消息爲之慢也不可  
倉惶恐懼有平得夫非失治誘發知惑之爲慢也又曰慢驚無  
爭攻蓋所療至爲難事無妄當制

醫慢驚不可與語無妨諫院付之無識不謹亦有之無見不明  
亦有之又不可言難恐於人事以存妙理究竟深得法道者投  
藥必愈不曉其理裁度未良者十萬無順人情投餌既無可治  
之說若或所見不到即與善術者調治庶不枉矣若也慢驚傷  
候必敗其德實有勉強爲難耶

慢脾風候則是慢驚風所傳凡由吐瀉脾虛驚與風傳入故曰

脾風其脾家受風其風無風可治也退驚無驚可療  
其風虛熱來者病至此所以難醫蓋由證與驚風風  
熱無異歸虛虛則脾所愛何故不曰胃風胃是陽其病即  
驚風也無胃候見既尚有胃氣可以一向生胃無與因陽即  
驚風更若更一向攻驚驚風脾亦不受而又傳教諸驚不可得  
治也藥若見服今即是脾風

慘脾風候下商以有商以艾灸之須臾驚動病候有已未驚  
絕之理若也一歲絕即不可引藥藥如無一者即黑四肢痿  
痺五軀俱冷並下之勉強下藥

嬰孩所患無驚慢驚脾二者皆由風寒所作以漸傳及未有初  
得病而便慢脾者急驚諸病或即吐瀉而得之類其氣虛脫而



腎乃子母也無與腎藥及諸補藥若治腎臟即他病發生故戒止不可療

嬰孩慢候皆由臟虛陽虧陰盛脈小兒所患臟病陽虛陰盛者無不入慢候而驚惟吐與瀉利由之積致入慢候其證速也虛又速也宜用良方治法循其次第無不獲安然其慢驚脾無令速愈頓戔之理既和且平更用調脾養胃萬一不可過劑用冷熱湯藥若失之可乎哉

慢驚風脈青而淡紫伸縮來去

慢脾風脈紫絲或黑絲隱隱相雜似出不出

小兒欲作慢驚則咽喉延響唇腮間紫緩喘乳噎眼目垂多啼辨虛實治之

喉內痰微響 眉腮垂紫筋 乳時常嘔吐 寒熱額浮青  
目碧多啼叫 風邪腦胃停 慢驚得此證 便與鎮心神  
慢驚風候要發紅 子細推求速有功 顛腫必無妙藥治  
驚丹與服也成空

小兒慢驚若見此證百不治 一皆為死候

垂舌搖頭數 魚睛并口禁 一身全不管 百卽似癱垂  
臉鼻唇青紫 無時瘈瘲煩 慢驚如有此 何必更看醫  
陰盛陽虛病已深 吐餘瀉後睡却睛 神昏搐緩涎流甚  
此證分明是慢驚

長啼多困面青黃 嘔乳痰生氣胃傷 風盛涎多驚惡候  
醒脾利膈藥為良

慢驚風變作死候

面色青白多困目睛陷

口噤白沫直視四肢不能收

四肢逆冷渾身腫如瓜

喉中涎如鋸唇青縮舌黑

瞳目乾嘔魚口面或如粧

外腎黑縮下瀉如牛皮膠

手足甲黑西消冷如冰

虛舌出口身上汗如雨

忽發大熱汗如珠下流

忽作大瀉身軀俱軟不能動

煩燥項強反張胸陷喘促

慢脾風證

慢脾曰脾風若逐風則無風可逐若治驚則無驚可治脾間痰

涎虛熱往來眼合脾困氣之神志昏迷此皆慢脾風難

治者慢脾風是也一名虛風慢驚本無熱乃虛者是也



其證面青額汗身亦汗粘其數凡小舌短頭低眼合不開  
搖頭困睡常吐舌頻嘔腥臭禁口咬牙手足微搐而不  
收或身冷身溫四肢厥逆脾氣困之神志昏迷虛熱往來  
痰涎凝滯眼半開半合手足不冷尚有慢驚不可回陽

治法治風無風可治驚驚無驚可截蓋肝胃虛可養脾安胃生  
津之藥大養脾圓參冬白朮散大醒脾散烏蝎四君子湯不拘  
時候煎服

鼻管中黑 睨睛口開 長吁長嘔 手足脾紫 硬氣噎痰  
羊睛視下 涎口浮青 眼圓瞳散 兩發際汗珠

論下痰

楊氏曰小兒慢驚慢脾欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣難大

來浮數是感強陽或認爲陽氣陽氣已沒有喉中痰涎此  
鋸一二日間閉目不開乃虛候之極虛痰抱養其氣

覆燈將滅又用藥下痰痰隨氣下氣隨痰絕醫殺之

慢脾風若是急驚傳來而尚有陽證其陽即虧不必回陽又不

可治陽只可截風調胃均平陰陽可冷可熱可緩可急是也

久瀉不止青白已 眼閉半開睛轉黑 虎口若見隱隱紋

此證名爲慢脾風 先服四聖定其搖 次進觀音散調服

只因脾臟受風寒 請醫子細調中脉

脾風先要睡 吐舌更搖頭 面青毛髮真 脚手曲如鉤

吐沫膠膿氣 千顆淚珠流 表汗通腸效 只恐瀉不休

忽然吐利又頻頻 四肢微寒目倒睛 面唇色白無紅艷

睛內無眵尿色青 診之遲緩無微細 手足微揚慢脾驚

慢脾死候

此病屬陰因吐瀉胃氣虛變成慢驚脾風四肢逆冷面青  
沉困氣喘是陰盛後乃陽氣不舒脾胃空虛及肺藏受風氣因  
膈脹滯此慢驚脾風切不得用涼藥取吐先發汗藥迴陽後用  
驚藥如加白麩上眼睛若更氣急瀉下果色嘔逆不治死候  
小兒吐瀉痢慢驚慢脾緣脾胃虛弱乳食不可過飽再傷脾胃  
鳳麟詩云傷於飯前命也休切宜戒之

溫驚圓

治嬰孩小兒急驚風熱搐倒痰壅

天南星

半兩

朱砂

小兒

錢

天竺黃

二錢

一分

延子臙脂

半

龍腦

半字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用沙糖煎湯研化食遠服

涼驚圓 治嬰孩小兒驚痰熱搐

龍膽草

防風

去蘆又

青黛

各三錢

鈎藤二錢

半黃

一字

麝香

一字

黃連

去蘆又

龍腦

一字

右為極細末煮麵糊圓如黍米大每二五十圓用金銀煎湯

食遠服

涼驚圓 治嬰孩小兒驚熱疳瘦乳癖

大黃

煨

黃連

去蘆又

龍膽草

防風

去蘆又

川芎

薄荷葉

各二錢半

右為極細末煮麵糊圓如芡。大青代為不每五七圓至二

十圓用滾白湯食前服

瀉青圓

治嬰孩小兒肝受風熱目睛上視驚搐

當歸

去頭蘆

龍膽草

川芎

梔子

去殼

羌活

去蘆

防風

去蘆又各一錢

大黃

紙裹煨半錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用竹葉砂糖同煎湯研化

食前服

利驚圓

治嬰孩小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利取驚

消積

辰砂

水飛半錢

南星

去皮半錢

巴豆

去殼心油半錢

右為研極細末蒸餅圓如黍米大看虛實或天時獻上服用

薄荷生薑同煎湯

利驚散 治嬰孩小兒心驚痰熱潮搐

輕粉一字

大竺黃

真麝各一錢

華牛 無頭末炒 五錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食前服

琥珀圓 治嬰孩小兒急慢驚風涎潮昏冒目睛抽搐驚風

痰乃和順滄瀉小可驚哭眠卧不安不除病根

辰砂 水飛

琥珀

牛黃

僵蠶 去嘴絲炒

天南星 牛膽製炒

全蝎 去毒炒

白附子 炮

代赭石 醋煅

天麻 煨

乳香

蟬蛻 各一錢

麝香 半錢

龍腦一字

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化或爲末不拘時候調服

安神圓 治嬰孩小兒心虛疳熱面黃瘦赤壯熱驚常神志恍惚不寧

芒硝

茯苓 去皮

山藥 九焙

寒水石 煨

甘草 炙

麥門冬 去心各五錢

朱砂 水飛

龍腦 一字

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用少糖煎湯研化食遠服  
安神圓 治嬰孩小兒鎮驚安神除風齒牙痛

人參 去蘆

天麻 煨

防風 去蘆義

山藥

地黃炒

甘草炙

琥珀一錢

全蠍去毒炒

殭蠶去青月

朱砂水飛

金箔一片

右為極細末入金箔和勻白木魚心圓如芡實大朱砂為衣

用鹽心土煎湯研化分兩時候服

生志圓 治嬰孩小兒驚風已退未定

琥珀

茯神去皮木

遠志去心土蜜製

人參去蘆

白附子炮

天麻根

天門冬去心

醋棗仁

甘草炙各一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大辰砂為衣用薄荷燈新同

煎湯研化食遠服



定志圓

治嬰孩小兒退驚化痰定志寧眠止焦啼

人參 去蘆

琥珀

金珀 去毒

天麻 煨

防風 去蘆

茯苓 去皮 木各二錢

真珠

白附子 炮

朱砂 水龍各一錢

甘草 炙一錢半

礞石 半錢

金箔 十二片

右爲極細末白米飯心圓如芡實大合藥湯煮反用麥門冬去心煎湯研化不拘時候服

定魄圓

治嬰孩小兒退驚安神定魄除痰牙齒

天麻 煨

人參 去蘆

龍齒 煨

防風 去蘆

茯苓 去皮

甘草 炙各二錢

琥珀 一錢

朱砂 分兩半錢

右爲極細末白米飯心圓如芡實大用蘊心土煎湯研化不拘時候服

辰砂化痰圓 治嬰孩小兒咳嗽化痰安驚驅風熱喘

辰砂水飛二錢半 白礬煨 白附子炮各五錢

天南星去膽水一兩 半夏麴一兩五錢

右爲極細末煮糯米生薑汁糊圓如黍米大每三五十圓用薄荷煎湯不以時候服

鎮肝圓 治嬰孩小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不醒人事是風熱

天竺黃 地黃生 竹葉

當歸去蘆 草龍膽 川芎

大黃煨

羌活去蘆

防風去蘆又各一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用沙糖水煎湯研化不拘

時候服

保命圓 治嬰孩小兒安神定魄驚跳止啼叫

人參去蘆

琥珀

犀角

甘草炙各一二錢 茯神去皮木

天麻煨各一二錢

金蝎一二箇 去毒炒 防風去蘆又

僵蠶去嘴炒

朱砂水飛各一錢 麝香一字

右為極細末白米飯心圓如芡實大用麥門冬去心煎湯研

化食遠服

七厘圓 治嬰孩小兒瘡痘將出潮熱痰盛手足搐搦

抱龍丸  
不知  
請

人參

白附子

防風

白朮

天南星

甘草

朱砂

麝香

右為極細末。煮麵糊圓如芡。實大朱砂。為衣。用麝香。早。黃子。

同煎湯。研化。不拘時候服。

抱龍丸。抱龍之義。抱者保也。龍者。心也。肝應東方青龍木。木

生火。謂生我者父母也。肝為母。心為子。母安則子安。況心臟神

肝臟魄。神魂既定。驚從何生。故曰抱龍丸。理嬰孩小兒諸驚。四

時感冒瘟疫。邪熱致煩燥。不寧。咳嗽氣急。瘧疾。欲出發搐。並宜

可投。其藥性溫平。不慥不燥。常服驅風化痰。鎮心解熱。和脾胃。

益精神。

琥珀

人參

天竺黃

檀香

茯苓

甘草

枳殼

枳實

辰砂

山藥

大南星

金箔

右為細末取新汲水和勻隨午圓如芡實大陰乾治法用

葱白煎湯或薄荷煎湯入真珠末一兩和勻不拘時候

驚曰湯心悸不安燈煎湯入真珠末一兩和勻不拘時候

服

龍圓

治嬰孩小兒驚風潮搐傷寒瘟疫身熱昏睡氣逆

實雅嗽瘡痘熱毒發搐乃八蟲毒中暑胃悶

天南星

炒八錢

辰砂

水飛

天竺黃

雄黃水飛各一錢 麝香一錢

石蒜極細末濃煎甘草水煮麵糊圓如芡實大雪水煮糊丸

佳用黃荷煎湯研化不拘時候服

拘攣治證同前

鬱金 茯苓去皮 甘草炙

靈香集各一兩 人參去蘆 雄黃水飛各五錢

山藥毛焙 辰砂水飛七錢半 金蟬去毒炒二錢半

麝香半錢 龍腦一字 金龜十片

石為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食前服

清心圓 治嬰孩小兒驚風潮搐精神昏積痰涎流涎并虛熱

煩燥頭痛惡心風眩不語嘔吐倦食

牛黃 一錢半

龍腦

麝香 各半錢

雄黃 水飛 一錢 川芎

茯苓 去皮

柴胡 去蘆

枳椇 去蘆 炒

犀角 各一錢

白朮 去蘆

黃芩 炒

黑豆 炒

阿膠 炒

麥門冬 去心

杏仁 去皮 各一錢半

人參 去蘆

神麝 炒

桂 去皮

乾薑 炮各一錢半

蒲黃 炒

芍藥 炒各一兩

山藥 炒八錢

甘肅 炙上錢半

羚羊角 錢丁半

金箔 一百五十片

右為極細末煉白蜜圓如芡質大黍著為衣用竹葉煎湯研

化不拘時候服

牛黃清心圓 治嬰孩小兒諸風狂亂驚癇痰涎壅塞精神昏

牛黃 一錢二分 羚羊角 錢一錢 均藥炒

防風 去蘆 白朮 去蘆 麥門冬 去心

黃芩 各一 當歸 去蘆半錢 人參 去蘆

薄荷 炒 神效 炒各二 犀角 錢二錢

山藥 去皮炒 桂 去皮一錢 白朮 七錢半

甘草 炙五錢 雄黃 水飛八分 龍腦 半錢

乾薑 炮七分半 茯苓 去皮 川芎

桔梗 去梗 杏仁 去尖煮麥炒研成膏

柴胡 去蘆炒各一錢二分半 麝香 錢



阿膠炒一錢七分半

去核皮研

金箔

一百一十片

大黑豆黃卷

炒一錢七分

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用竹葉煎湯研化不拘時

候服

牛黃清心圓 治嬰孩小兒四證八候天厚痰熱驚風

南星

半夏

白附子

川烏

各一兩並洗

川礬金

五錢

右五味作麤末用臘月黃牛膽三個取汁和藥入膽內乳懸當風處三月乾取出入添馬牙砒米砂雄黃鵝砂各一錢麝香少許如膽藥一兩硝砂四味各一錢稀麵糊圓如芥米大金銀薄荷煎湯服一歲十圓

天麻防風圓 治嬰孩小兒驚風身壯熱

聖精神昏憤痰涎不利及風濕邪氣

全蝎 去毒炒 僵蠶 去毒炒 天麻

防風 去麝 人參 去毒炒 辰砂 水飛

雄黃 水飛 甘草 炙 牛黃 各一錢

麝香 半錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化不拘時

候服

金箔鎮心圓 治嬰孩小兒風驚痰厥心動不安驚悸煩渴唇

焦頰赤夜臥不安謔語狂妄急驚驚搐

紫荷車 用黑口長尖針 人參 去毒炒

切作片一錢半

去毒

甘草

茯苓

去皮各

白朮

去皮一兩五錢

牙硝

枯一錢半

辰砂

水飛

一錢

麝香

半錢

龍腦

一角

金箔

十二片

右為極細末煉白蜜圓如芡實太金箔為衣用薄荷煎湯研化食後服常服安鎮心神散敗邪熱涼咽膈止驚啼  
大鎮心圓 治嬰孩小兒精神不寧驚悸必驚心忪恐悸四肢戰掉舉動欲倒壯熱暗熱或煩燥而多啼退驚風化痰涎壯心氣益精神

犀角

鎔

鐵粉

各一兩

鈴手

鎔

龜甲

鎔

天麻

煨

甘蒲

各五錢

牛黃

茯神

去皮水

遠志

去心

天竺黃

蛇蛻皮

鼠屎

人參

去蘆各二錢半

桂

去皮二兩

熊膽

一分

辰砂

水飛一錢

金箔

五十片

銀箔

五十片

右為極細末煉白蜜圓如芡實大

用薄荷煎湯研化食後服

心圓

治嬰孩小兒涼心經驚熱痰盛

甜菊

人參

去蘆各一兩

甘草

炙

寒水石

煨各一兩五錢

山藥

茯苓

去皮各二兩

朱砂

水飛一兩

龍腦

麝香

各一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用滾白湯研化食後服如

嬰紅色入坯子懸脂二錢

鎮心圓

治嬰孩小兒鎮心解熱退驚回赤止啼

治婦人經水不調

全蝎

去毒每箇用生薄荷一握包了

天麻

微

寒水石

微

防風

去毒又

羌活

去毒

赤茯苓

去各二錢

犀角

鎔

甘草 各二錢

朱砂

水飛

麝香 一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

鎮心圓

治嬰孩小兒急驚化痰鎮心

朱砂

水飛

龍齒

牛黃

各一錢

鐵粉

琥珀

人參

去毒

茯神

去毒木

防風

去毒

全蝎

去毒炒十箇

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化不拘時

候服如無牛黃可用製牛膽天南星代

丹砂鎮心圓 治嬰孩小兒心神不安有時驚悸目睛偏視

延不利痙瘓安鎮心神定驚止搖

辰砂 水飛一兩 天麻 煨二兩 人參 去蘆

甘草 炙 茯苓 去皮各五錢 天竺黃

鉛白霜 各二錢 牛黃 一錢 龍腦 一角

麝香 半錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用金銀薄荷同煎湯研化

不拘時候服

消驚圓 治嬰孩小兒驚風鎮心利痰解熱

人參 去蘆 天麻 煨 茯苓 去皮

朱砂 水飛 全蝎 土薑炒 僵蠶 土黃煎炒

羚羊角 錢

犀角

錢各一

麝香

一字

天南星

牛膽製四錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用葛蒲煎湯研化食後服  
牛黃圓 治嬰孩小兒膈熱痰涎稠盛心神不寧睡不安穩煩  
燥怔忡四躄作熱驚風痰熱

葛根

炒一兩

防風

去蘆義

山梔

去殼

甘草

黃芩

炒各二錢半

麝香

一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

鎮驚圓

治嬰孩小兒急慢驚風痰壅手足抽掣口眼喎斜煩

燥生疳精神昏悶常服安心鎮驚疎風順氣

人參

去蘆三錢

甘草

半生

半炙

扶神 去炭木

殭蠶去青絲炒 枳殼麵炒 白附子炮

天南星牛膽炒 使令去皮 鰾砂

牙硝 硃砂水飛各一錢半 全蝎去尾毒十箇

麝香一字

右為極細末糯米煮糊圓如芡實大用生薑煎湯浸驚薄荷煎湯或麥門冬去心煎湯研化不拘時候服

五雷丹 治嬰孩小兒急慢驚風

蛇含石醋煨 天南星炮去皮 白附子炮

辰砂水飛 麝香 青礞石

天麻煨 牛黃 天竺黃

羌活土薑 茯苓去皮 防風土薑又各



全蝎

去毒

僵蠶

去紫絲炒

川烏

去尖罈炮

鮮金

雄黃

水飛各一錢

龍腦

七分半

金箔

二十片

右為極細末甘草熬成膏搜和為印錠用薄荷煎湯研化不

拘時候服

龍虎壽生丹

治嬰孩小兒急慢驚風

全蝎

去毒絲炒十四箇

天麻

煨一二錢

僵蠶

去紫絲炒

辰砂

小飛

天南星

炮去

白附子

炮

白化蛇肉

去骨酒浸

防風

去蘆又一二錢

代赭石

煨

鐵孕粉

各半錢

龍腦

一字

麝香

一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大金箔為衣用薄荷煎湯研化不拘時候服

壽生丹 治嬰孩小兒驚風危篤

人參 去蘆

天麻 煨

防風 去蘆 各五錢

殭蠶 去嘴 炒

全蝎 去毒 炒 各二錢半

雄黃 水飛

蟬蛻 去頭足

天南星 半膽製 炒 各半錢

牛黃

獨角仙 去頭翅足

甘草 炙 各一錢

白花蛇肉

酒煮熟 一錢半

辰砂 水飛

麝香

各二錢半

代赭石

醋潑七次 一錢半

慢驚白附子

炮一錢二分半

半夏麴

炒一錢

左為極細末煉白蜜圓如芡實大金箔為衣用薄荷煎湯研

化不拘時候服

至寶丹 治嬰孩小兒諸癩急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩  
驚風抽搐及傷寒狂語伏熱嘔吐

犀角

生玳瑁屑

琥珀

朱砂 水飛

雄黃 水飛各一兩

金箔 五十片

銀箔 五十片

龍腦

麝香 各一分

牛黃 五錢

安息香 用無灰酒飛過濾淨去砂石約取一兩慢火熬成膏

右為極細末令勻將安息香膏以重湯煮凝成和搜為劑如  
乾即入煉白蜜盛不津器中旋圓如梧桐子大用人參去蘆  
煎湯研化不拘時候服

鎮心至寶丹 治嬰孩小兒驚風抽搐吐熱涎多魚口鵝般服

晴直視

天南星

去毒

白附子

炮

雄黃

水飛

全蝎

去毒炒各五錢

僵蠶

去毒炒

礞石

各一兩

龍腦

麝香

各二錢半

辰砂

水飛一分

膩粉

二錢

滑石

二兩

右為極細末煉白蜜圓如皂莢子大金銀箔為衣用薄荷煎湯研化食後常服鎮心神涼咽膈

聚寶丹

治嬰孩小兒心脾不定熱盛痰多因驚而感風邪身

脉潮熱牙關緊急手足搐搦

全蝎

去毒每箇用生薄荷一皮包了

照

琥珀

人參

去虛

茯苓

去皮

防風去蘆義

玳瑁屑

犀角

甘草炙各三錢

牛黃

真珠

朱砂水飛

麝香

龍腦各一錢

金箔

銀箔各十片

右為極細末白米飲心圓如芡實大用釣藤煎湯研化不約

時候服

鎮心丹

治嬰孩小兒搐後脾胃尚虛心膽俱怯齒齙好睡

人參去蘆

龍齒煨

茯神去皮木

防風去蘆義各三錢

甘草炙一錢半琥珀半錢

全蝎去毒十

辰砂一錢心內煎熟入猪

湯右為極細末白米飯心圓如芡實大用釣藤寗心土同煎湯

研化不拘時候服

至聖保命丹

治嬰孩小兒胎驚肉跳腹肚攣硬目睛上視手足

搖掣角弓反張痰涎壅盛急慢驚風

全蝎

去毒炒

僵蠶

去嘴絲炒

天南星

去痰炮

白附子

炮

辰砂

水飛

蟬蛻

去土各一錢

防風

去蘆義

天麻

煨各二錢

麝香

去錢

金箔

十片

右爲極細末燂飯取中心軟者圓如芡實大初生兒半圓用乳汁研化全銀薄荷煎湯不拘時候服常服鎮心安神化痰除一切驚風證

保命丹

治嬰孩小兒急驚風候傳慢驚

辰砂水飛

茯苓去炭

白附子炮

牛黃

天南星炮各一錢

全蝎去毒炒五錢

天麻煨

甘草炙各一錢半

鵬砂一錢

龍腦

麝香各半字

右為極細末煮麵糊圓如芡實大用金銀薄荷同煎湯研化不拘時候服

太乙萬金丹 治嬰孩小兒驚風痰熱

代赭石醋煨

全蝎去毒炒

朱砂水飛

琥珀

天南星土皮

白附子生

防風去蘆義

烏蛇酒浸炙

天麻煨各一錢

麝香一字

右為極細末粟米煮糊圓如梧桐子大急驚用薄荷煎湯和

傳慢驚尚有陽證用人參大蘆煎湯研化不拘時候服

至聖寧心丹 治嬰孩小兒女神退驚止焦啼寧眠

人參去蘆 防風去蘆 天麻煨

蝎蛇去毒 龍腦煨 茯神去皮木

甘草炙 酸棗仁去皮炙 一錢

朱砂 麝香分

右為極細末白米飯心圓如芡實大用麥門冬去心煎湯研

化食遠服

太乙保生丹 治嬰孩小兒慢驚尚有陽證

全蝎去毒炒 白附子炮 僵蠶去嘴絲炒



蟬蛻去土

牛膽天南星炒

琥珀各一錢

防風去蘆又

辰砂水飛各半錢

麝香二分半

右為極細末粟米煮糊圓如芡實大入薄荷為衣用薄荷煎湯研化食遠服

五福化壽丹 治嬰孩小兒驚積毒熱驚惕狂燥頰赤咽乾口舌生瘡夜臥不安譫語煩渴頭面身熱多生瘡癰

桔梗

去蘆炒

玄參

去蘆各二兩

青黛

牙硝枯

人參

去蘆各二兩

甘草炙七錢半

茯苓

去皮二兩五錢

麝香

二分半

金箔

銀箔

各四片

右為極細末煉白蜜圓如大實大用薄荷煎湯研化食後服  
及瘡癰後餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黃白汁服用  
雞翎掃在口內熱指肌肉黃瘦者日夜不見物陳粟米泔水  
研化服

五福化毒丹 治嬰孩小兒驚風涼心膈

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

玄參

甘草

甜硝

青黛

右為極細末煉白蜜圓如大實大用水研化食後服

至聖奪命丹 治嬰孩小兒急慢驚風風癇中惡客忤物忤口

眼鳴斜痰

人參去蘆

茯苓去皮

白朮去蘆

天麻去蘆

天南星去皮

半夏去蘆

羌活去蘆

扶神去皮

川烏去皮

獨活去蘆

細辛去蘆

蟬蛻去足

獨活去蘆

荊芥穗

酸棗仁去皮

遠志去心

川芎

白附子炮

白芷

桔梗去蘆

甘草炙

石菖蒲各一錢

雄黃去飛

麝香各半錢

全蝎去毒炒

防風去蘆

金箔

銀箔各十片

右為極細末生薑汁煮麵糊圓如芡實大辰砂為衣用金銀

薄荷煎湯研化不拘時候服搗下止雞冠血不吐息急服

治驚風至重者

大聖奪命金丹

治急慢驚風癇積天動各忤物忤中惡及初

生癰風撮口着紫胎驚胎癰牙關緊等驚風痰熱搐搦顛反

引竄視昏悶不醒但是一切驚風危惡緊急之證並皆治之其

效如神其他驚藥功力俱不及此真起死回生良劑

天麻炮

全蝎

去毒炒

僵蠶

去嘴然炒

天南星

去皮

防風

去蘆叉

羌活

去蘆

白附子

炮

茯神

去皮木

川芎

遠志

去心

杜梗

去蘆炒

石菖蒲

半夏

半

人參

去蘆

白朮

去蘆

茯苓 去皮

酸棗仁 去皮炒 荊芥穗

細辛 二葉各五錢

川烏 去鹽連 甘草 炙三錢

烏蛇尾 酒浸炙 大赤足蜈蚣 一

余薄荷才浸焙

沉香 辰砂 水飛 龍齒

珍珠 各三錢 金箔 二十片 銀箔 四十片

琥珀 二錢 雄黃 一錢 麝香 一錢

石為極細末薑汁煮麵糊圓如芡實大辰砂為衣用金銀薄荷煎湯研化不拘時候服如欲存久且安暖處常加晒焙免失藥味驚風牙關不開搐鼻鼻小嚏以藥入搐鼻開關

犀角地黃膏 治嬰孩小兒關風即掣跳者肝肺不足魂魄不

隱故神不安非謂驚也

天門冬去心

麥門冬去心

茯苓去皮

茯神去皮木

地黃生

前胡去蘆

柴胡去蘆

人參去蘆

玄參去蘆

甘草炙

川芎

天麻煨

羌活去蘆

防風去蘆又名一錢

石為極細末煨金墨一小挺存性煉白蜜圓如芡實大金為

為衣用薄荷煎湯研化食後服

大青膏 治嬰孩小兒驚熱涎盛眠卧不安或即發搐

大青葉二錢半 白附子錢半 青黛

天麻煨各一錢 全蝎尾去毒半錢 朱砂水酒一字

麝香一字 烏梢蛇酒浸半錢 天竺黃一字

右為極細末生蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食遠服

百枝膏 治嬰孩小兒安心寧神

人參去蘆 防風去蘆 天麻煨

茯神去皮木 白附子炮 琥珀

酸棗仁去皮 石菖蒲各一錢 麝香少

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用麥門冬去心煎湯研化

不拘時候服

寧心膏 治嬰孩小兒精神不定恍惚不安恐畏多哭如人將

抽眠睡驚魘常服鎮心除百病

人參去蘆 白朮 茯苓去皮

茯神去皮木 山藥 龜板去鱗

甘草 各一錢 茯苓 各二錢 龍腦

麝香 各一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

寧神膏 治嬰孩小兒鎮心退熱定驚身熱壯熱

人參 去蘆 茯苓 去皮 川芎

羌活 去蘆 天麻 酒洗 防風 去蘆

甘草 炙各二錢 朱砂 水飛半錢 麝香 一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用麥門冬去心煎湯研化

不拘時候服

寧眠膏 治嬰孩小兒驚風驚厥心神恍惚眠睡不安

甜硝 人參 去蘆 辰砂 水飛



全初小錄

茯苓 去皮

山藥 各一兩

甘草 炙

寒水石

煨各二錢半

龍腦

一分

麝香

半錢

右為極細末入坏臙脂一錢煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

驅風膏

治嬰孩小兒去風除熱消痰

寬筋脉退眼上視

防風

去蘆義

琥珀

白附子 炮

甘草

炙

天麻

煨

辰砂

水飛

全蝎 稍去毒

二錢

鐵粉

真珠

各一錢

麝香

半錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化不拘時

候服

驚風膏

治嬰孩小兒肝風筋脈

急而紅目青眼上驚

胎風

辰砂 水飛

全蝎尾 去毒

當歸 去蘆

龍膽草

川芎

山梔子 去殼

大黃 紙裹煨 羌活 去蘆

防風 去蘆

甘草 炙各一錢 麝香 一字

右為極細末煉沙糖圓如芡實大用薄荷竹葉同煎湯研化

食前服

羌活膏 治嬰孩小兒急慢驚風

羌活 去蘆

防風 去蘆

川芎

茯苓 去皮

茯神 去皮

白朮

李幼心錄

白附子炮

全蝎

去毒炒

僵蚕

去青炒

加天麻煨

牛膝天南星炒各一錢

右為極細末煉蜜圓如芡實大辰砂為衣用麥門冬去心薄荷同煎湯研化不拘時候服

牛黃膏

治嬰孩小兒驚風涼膈鎮心除咳嗽止煩熱

甘草

炙半生

雄黃水飛

鬱金各一錢

甜硝

二錢半

寒水石

生一兩

苳豆五錢

龍腦

一字

右為極細末煉白蜜圓如皂子大用薄荷煎湯研化食後服

牛黃膏

治嬰孩小兒急驚風熱夜啼痰促

雄黃

小素大胡蘆煎汁醋

甜硝

甘草

炙甘草二錢

辰砂

小辰砂半錢

寒水石

龍腦

一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食後服

金定錠

治嬰孩小兒急慢驚風

辰砂

水飛

人參

上片

白朮

茯苓

去皮

茯神

去皮

五靈脂

水飛

山藥

赤石脂

煨令赤

麝香

一錢一角

乳香

五錢

金箔

二十片

右為極細末白米飯心印錠金箔貼錠面用薄荷煎湯研化

不拘時候服

尋星錠

治嬰孩小兒胎驚風熱丹毒

黃連

去鬚炒

蛇干

去殼

黃蘗

黃芩

炒各一兩

薄荷葉

川芎

羌活

去蘆

當歸

去蘆炒

防風

去蘆又

天南星

牛膽製炒

半夏

炒

天麻

煨各五錢

滑石

水飛兩

犀角

一兩二錢

麝香

一錢

上石礬極細末煮糯米糊印錠用生薑薄荷同煎湯研化不拘

時候服

青星錠

治嬰孩小兒急慢驚風

防風

去蘆又

人參

去蘆

白朮

麩炒

遠志

去心酒

茯苓

去皮

茯神

去皮

川芎

僵蠶

去嘴絲炒

白芷

鹿肉 不去心

甘草 炙各二錢

蜜香葉 一錢

天麻 煨

白附子 炙各二錢

桔梗 去蘆炒

大南星 去臍皮

羌活 去蘆

琥珀 各一錢半

鉤藤 九錢

全蝎 去毒炒

辰砂 水飛二錢

蟬蛻 去土足

麝香 一角

金箔 二十片

山藥 炮二錢

右為極細末煉白蜜印錠用薄花煎湯研化不拘時候服

保生錠 治嬰孩小兒急慢驚風盤腸內疝腹痛啼身若反

弓眼直上視手足搐搦痰涎潮壅卒中客忤睡卧不安乳食不

下

蛇含石 煨

代赭石 煨七次各一兩

黃連

去須炒 各五錢

人參

去土 各二錢半

天竺黃

白附子

犀角

鎔

生真龜

全蝎

去毒炒

僵蠶

去骨炒

天麻

羚羊角

鎔各錢

天南星

牛膽製 一錢二分半

麝香

半錢

右為極細末煮糯米糊印錠用薄荷煎湯研化食遠服

鎮心餅

治嬰孩小兒急慢驚風

人參

去蘆

赤茯苓

去皮

甘草

山藥

各五錢

辰砂水飛

桔梗炒各二錢半

乳香一錢半

麝香二分

石礞石細末煉白

餅用薄荷煎湯研化不拘時候服

人主蠟餅

治嬰孩小兒鎮心去驚

神定志驚之輕者常服

全蠟

去毒薄荷汁浸炙十四箇

殭蠶

去嘴熬炒五錢

酸棗仁

去皮炒

茯神

去木

天花粉

桔梗

去蘆

天麻

煨

遠志

去心

羌活

去蘆

甘草

炙久三錢

右為極細末煮麵糊為餅朱砂澄

夜全蠟薄荷煎湯研化不

拘時候服

大乙丹

治嬰孩小兒急慢驚風

吐潮發搐搦口眼相引項

背強直精神昏困痰涎不利

天南星

去膽炮

烏蛇

各酒浸

天麻

酒浸一宿

附子

炮去尖

麻黃

酒浸

全蠟

去毒炒一錢半



白附子

炮三錢

僵蛇

炒四錢

已上爲細末以水一升調服三服

食麴一斗拌勻踏作餅

須六月六日楮葉卷七日取出

用紙袋盛掛當風十四

日可用每餅末一兩入下項藥

琥珀

一錢

辰砂水飛

錢雄黃水飛三錢

甘草

炙一錢半

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大

滾水研化不拘時候服

太白散

治嬰孩小兒急驚風抽搐

粉霜

一錢

輕粉

白牽牛

炒各半錢

右爲極細末一字用薄荷煎湯調服

食前服吐瀉效

順搖散

治嬰孩小兒解男右女左

不順者

枳殼去穢

釣藤去鈎

荆芥穗

羌活去蘆

防風

去蘆又

甘草炙各一錢

右咬咀生薑三片煎入薄荷三葉不拘時候服

霹靂散

治嬰孩小兒急慢驚風不醒人事

猪牙皂角三錢

細辛

川芎

白芷各二錢

躑躅花一錢半

右爲極細末少許用大燈薪三寸長蘸點鼻內得噴嚏爲驗

煎藥不可焙焙則不應

宣風散

治嬰孩小兒驚風痲痺風熱

檳榔去穢二箇

甘草炙

橘皮

去白各五錢

牽牛

半生半炒熟頭末二箇

右爲極細末用白蜜煎湯調化食前服

宣風散

治嬰孩小兒急驚風熱喘

白牽牛

生末

黑牽牛

各一兩

大黃

煨五錢

檳榔

去穢二錢

辰砂

水飛一錢

輕粉

一字

青礞石

煨

膩粉

各一錢

右爲極細末用白蜜煎湯調化食前服

導赤散

治嬰孩小兒內虛邪熱煩燥悶亂傳流下經小便赤

澀淋瀝痛中滿痛

地黃

生

水通

去穢

甘草

炙各一錢

右爲極細末用竹葉煎湯調化食遠服一升不用甘草用黃

芩

牛黃奪命散

治嬰孩小兒急驚風

扇動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽

肺脹喘滿胸高氣急兩脇

馬脾風若不急治死在朝夕

白牽牛

生半熟頭末

檳榔

土六分

黑牽牛

半生半熟頭末

大黃

煨各五錢

右爲極細末用白蜜煎滿調化

袋前服痰盛加輕粉一字

真珠散

治嬰孩小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡卧驚跳時

或咬牙啼叫不已小便赤澀或吐黃沫

真珠

海螵蛸

滑石

水飛

辰砂

水飛各一錢

人參

土六分

白附子

炮各二錢

全蝎

去毒炒

甘草

炙

麝香

各半錢

龍腦 一角

金箔

銀箔 各五片

右為極細末用燈新麥門冬去心入蜜同煎湯調化不拘時

候服

清寧散

治嬰孩小兒驚熱出於心肺須從小便利之

桑根白皮

去皮蜜炙

葶藶

隔紙炒

赤茯苓

去皮

車前子

梔子

去殼各錢

甘草

炙半錢

右咬咀生薑三片棗一箇去核同煎食前服

全蝎散

治嬰孩小兒急慢驚風發搐化痰截驚

全蝎

十二箇用新薄荷葉包全蝎竹片夾定慢火焙上炙三次用酒浸開

僵蠶

二錢半去蠶殼用新薄荷葉包僵蠶竹片夾定慢火焙上炙三次用酒浸開

天南星

五錢去膽湯泡七次再炙九次切片生薑一兩薄荷五葉同煎鳩子餅

防風 去蘆義

天麻 煨

甘草 炙

辰砂 水飛

川芎

白附子

炮各二錢半

右為極細末一歲一字二歲半錢用薄荷煎湯調化食遠服

身熱發搐導赤散加防風 去蘆義 黃芩 炒

慢驚生薑薄荷煎湯調化服

保命散 治嬰孩小兒胎中受驚一百二十日內發搐

防風 去蘆義

天麻 煨

琥珀

甘草

炙各二錢

白附子

炮

天南星

半錢製炒

辰砂 水飛

右為極細末一字由銀絲絹湯調化食遠服

天王散 治嬰孩小兒吐瀉或候服冷藥脾虛生風成慢驚

天南星一箇重八九錢去臍淨黃土地坑子深三寸  
炭火五斤燒通紅赤入好酒半盞後入天南星却用  
炭二兩條蓋却坑子候天南星微變取出剉碎再炒  
熟為極細末用五錢天麻煨取末一錢麝香一字和  
勻三歲半錢用生薑防風去毒又煎湯調化不拘時  
候服亦治久嗽惡心

### 四聖散

治嬰孩小兒慢驚痰滯虛熱若有窺視搐搦證壯以  
少許用管吹入鼻中

全蝎

去毒炒

僵蠶

去嘴絲炒

天南星

去毒七錢半

川烏

去脂三錢生

右將天南星礱極細末水

作餅敷全蝎僵蠶川烏外用水

浸濕紙重可更火灰中煨赤色放在地一伏時取出研末  
細末一字用金銀煎湯點清茶少許調化不拘時候服  
養活通關散 治嬰孩小兒搐證已定關數未通啼聲未發乳  
食不進

養活 上五錢

白附子 炮各一錢 川芎

細辛 去蘖 防風 去蘖

全蝎稍 去毒

甘草 炙各二錢

右以咀用燈薪六莖麥門冬去心同煎食遠服

醒脾散 治嬰孩小兒吐瀉不止痰作驚風脾困昏沉沉默默不  
食

木香 炮一錢 全蝎 去毒炒 天麻 煨



人參去蘆

茯苓去皮

白朮

白朮去皮

白附子炮

甘草炙各二錢

右為極細末用煮上核煎湯調化不拘時候服

醒脾散

治吐瀉脾困不食痰作驚風

全蝎去毒炒

白附子炮

天麻煨

甘草炙

人參去蘆

茯苓去皮

石菖蒲細切

木香

石蓮肉去心

白朮各一錢

右為極細末用生薑煮上核煎湯調化有熱者去木香不拘

時候服

大醒脾散

一方便通用驅風醒脾胃虛不消乳食尤須節酌

天南星

茯苓法皮

橘紅各二錢半

全蝎

去毒炒

甘草炙

白附子炮

蓮肉

去心

人參去蘆

木香各錢二分

陳倉米

二百粒

右剉散用生薑三片煮一箇去核同煎食後服

大醒脾散

治嬰孩小兒慢脾風肉虛昏迷不醒

人參去蘆

白附子炮

天麻煨

甘草炙

金蝎

去毒炒

石蓮肉

去心

茯苓去皮

木香

白朮去梗

石菖蒲

細節

橘紅去白

山藥炒

天南星

去膽炮

肉豆蔻

炙暴燥去油各二錢

縮砂

去殼二錢半

丁香

錢半

石以阻用生薑三片棗一箇去核同煎食前服回陽加附子

去脂皮

白薑

吉州醒脾散

治證同前

人參

去虛

楠紅

去白

甘草

炙

白朮

去梗

茯苓

去皮

全蝎

去毒炒各五錢

木香

半夏

各二錢半

白附子

炮四箇

天南星

炮一箇

陳米

二百粒

右剉散用生薑三片棗一箇去核同煎不拘時候服

八仙散

治嬰孩小兒慢驚虛風

天麻

白附子

炮

花蛇肉

酒浸

方風 去風義

天南星 炮去毒 半錢

全蝎 去毒炒

冬瓜仁 炒各半錢

右以明用生薑三片棗一箇去核同煎食後服

觀音散 治嬰孩小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉久泄

食久則漸漸羸弱大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛則泄

已以防慢候

人參 去蘆一兩

茯苓 去皮一錢半

神麴 炒二錢

石蓮肉 去心炒

黃耆 蜜炙

木香

白扁豆 炒去皮 甘草 炙各一錢

右以明用棗一箇去核薑香二葉同煎食後服

金蝎觀音散 治證同前

全蝎

去金時炒

天麻

煨

防風

去蘆義

白芷

各二錢半

黃耆

蜜炙

甘草

炙

茯苓

去皮

白糯米

生薑汁浸去皮炒各一錢半

人參

去蘆二錢

上為極細末用棗一箇去核炙仁炒同煎湯調化不拘時

候服

寶脾散

治嬰孩小兒脾胃虛冷吐瀉不止不進飲食慢驚

脾癰瀉

痢不能收瀉

人參

去蘆

白朮

茯苓

去皮

縮砂

去殼

麥蘖

炒

神曲

炒

石蓮肉

去心

橘皮

去白

良薑

油炒

山藥去皮炒

青皮

去穢炒

冬瓜仁

炒各二錢半

肉豆蔻

剉 煨 去油 一二箇

陳米

一撮炒

白扁豆

炒去皮

甘草

炙

丁香

薏苡仁

炒各一錢

香附子

炒

木香

半錢

右為極細末用東去核煎水調化食遠服或米飲亦可

慢驚慢脾手足厥冷加附子理中湯同服

冷吐痢加附子訶子煨去法同服

玉桂枝散

治嬰孩小兒等慢驚風發不時醒

全蝎

去毒炒 七箇

薄荷

十四葉

麻黃

七糸

白朮

五錢

右三味溫湯浴潤以兩葉蒸蝎一箇用麻裏七糸縛定炒至

煎黑次入白水生薑自然汁浸透焙乾石為極細末每服半錢用柿蒂煎湯食遠服

調中湯 治嬰孩小兒慢驚驚和脾胃止吐瀉溫中正氣

人參 去蘆

白朮 去梗

茯苓 去皮

甘草 炙

白芷

石蓮肉 去心

藿香葉

天麻 焙

橘皮 去白

白扁豆

生薑汁浸炒去皮

半夏 麴

木香

各半錢

右剉散用生薑二片棗一個去核同煎不拘時候服

理中湯 治嬰孩小兒吐瀉手足厥冷加附子回陽

人參 去蘆

白朮 去梗

乾薑 炮

甘草

右以咀用生薑三片棗一箇去核治口煎食前服

烏蝎四君子湯治嬰孩小兒慢驚慢脾風吐瀉不止

人參

白朮

茯苓

甘草

加川烏

全蝎

右以咀用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

溫膽湯治嬰孩小兒驚悸煩痰

半夏

枳實

酸棗仁

陳皮

茯苓

甘草

右以咀用生薑三片棗一箇竹茹一撮同煎不拘時候服



醒風湯  
搦驚悸

治嬰孩小兒胎氣虛弱因吐瀉後胃虛生風手足搐

天麻

防風

人參

白附子

全蝎

僵蚕

天南星

甘草

右以咀月生薑三片冬瓜仁三十粒同煎不拘時候服

定命飲子 治嬰孩小兒吐瀉脾胃虛弱發作慢驚風搐搦不

已截風不止取痰不下散熱不退即驚不去欲傳慢脾風候

半夏

天麻

甘草

茯苓

白朮

生薑

右剉散用生薑三片棗一箇去核同煎服或作細末服

紫草飲 治嬰孩小兒早微熱至晚大熱面赤目黃呵欠惡寒口出熱氣痰涎壅盛手足搐搦

紫草

蘇木

甘草 各二錢

川升麻 煨

芍藥 炒

葛根 各四錢

右以用蟬殼一箇土麻膝葱白一寸同煎不拘時候服

易氏曰吐瀉成慢驚慢脾虛風且斷乳今兒飢甚以釀乳法乳兒

人參 土產

木香

藿香葉

沉香

橘紅 去白

縮砂 去殼

丁香

神麴 炒

麥蘖 炒

虛者其加白蜜 痢不止加訶子煨 吐不止加生薑汁

右咬咀用生薑五片紫蘇十皮棗二箇至後同煎令乳母服  
去毒乳盡服即仰睡霎時令藥入乳令兒旋喫數日不可過  
飽令兒吐泄再瀉脾胃

癰

楊氏曰癰者小兒之惡病也小兒血脈不斂骨氣不聚為風邪  
所傷為驚悸所觸為乳哺失節停滯結聚經絡而得之

湯氏曰十歲以上為癰十歲以下為癰

楊氏曰癰曰五癰病分五臟調治之法惟以驚風金三癰治之  
又當別以陰陽二證此為要法大槩血滯心散邪氣在心積驚  
成癰宜通行心經調平心血順氣豁痰為良法也

楊氏曰發癰耳後高骨間必有青紋紛紛如線急與抓破令血

出叫啼尤得無遺

凡醒兒夜不可夜露恐為雌鳥所食能成癰

其證神氣稀鬱瞪眼直視面目青引口噤涎流腹肚膨大手足搐掣似死似生或聲或嘿以項背反張或腰脊強直但四肢柔軟發而時醒者為癰在一身強硬終日不醒則為瘰癧矣

癰曰五癰病關五臟

心癰面赤目瞪吐舌齒齒心下煩燥氣短息數

肝癰面青唇青其眼上竄手足拳攣抽掣反折

脾癰面黃眼睛直視腹滿目如四肢不收

肺癰面如枯骨目白及視驚跳搖動亦吐涎沫

腎癰面黑而晦振目視人其吐清沫不動如尸

此五臟之證然調理之法惟以辨風食三種陰陽二證別而治之

風癰者汗出解脫風邪乘虛其初起指如計數有熱主痰是也  
驚癰者震駭恐怖打墜積驚其初發叫大啼恍惚神魂是也  
食癰者食時得驚停宿結滯其初叫乳不哺大便酸臭或結成  
乳癖先寒後熱是也別之以陰陽則始者身體有熱抽掣主啼叫  
是爲

陽癰陽病脉浮面色元澤病在六腑肌膚此猶易愈始者身體  
無熱手足清冷不抽掣不啼叫是爲

陰癰陰病脉沉面色黧晦病在五臟骨髓此取難痊或仰卧屬  
陽覆卧屬亦可參驗陽證不可用溫陰證不可用寒

風癰則先爲之散風

驚癰則先爲之利驚

食癰則先爲之消積續以定癰等劑主之若臟若腑一陰一陽是固不可無別小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常驚悸此皆發癰之漸即以紫圓子導之時間量與紫圓子減其盛氣則無驚風癰癰之退癰證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急爲爪破須令血出啼叫尤得氣通潮濕兒衣不可露天恐爲純雌落羽所汚染觸其間未有不爲癰也挾邪恠者而色變易不常見人羞怕諸癰瘡不能言者蓋咽喉爲氣之道路風傷其氣以掩聲言道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致爾

論陰陽癰證

關氏云急慢驚古人書無之惟曰陰陽癰所謂急慢驚風者後世名之大抵治法須判陰陽癰急驚陽動而速身熱脈浮口中氣熱大便實而小便赤或食不食其病在腑而易治也陰癰慢驚陰靜而緩身涼脈沉口中氣冷大便瀉而小便青或吐或不吐其病在臟故難治也

分陰陽癰證

吐虛者曰慢驚風	瀉虛者曰慢脾風	吐瀉虛者曰陰癰
吐熱驚搐曰陽癰	慢驚風眼偏喜開	慢脾風眼偏喜閉
陰癰眼半開半閉	陽癰眼半鮮半青	急驚風十生一死
慢驚風十死一生		

風癰之因

風癰者因將養失度血氣不和或厚衣汗出腠理開舒風邪入焉曰風癰其病在肝肝主風驗其證目青面紅發搐是也

驚癰之因

驚癰者因血氣盛實臟腑生熱或驚怖大啼精神傷動外邪所入爲之者曰驚癰其病在心心主驚驗其證忽然叫聲發搐是也

食癰之因

食癰者因乳食過多傷動脾胃或食傷中脘因生痰熱氣逆上衝爲之者曰食癰其病在脾脾主食驗其證腹中氣脹發搐是也



已上三證大同小異並屬陽也各目睛斜手足潮搐或作猪聲發過即差皆十生一死也

論陰陽癰差後復作證

陰癰差後復發多死設有安者必須少神眼目鮮斜語言不正或口有痰涎流溢頤下或手足偏癱陽癰差後復作多涎緣驚風有兩種所作忽發癰在耳失治風涎流滯心包絡間或因驚而再發或感風而發或傷食而發過如舊或進退不定潮作有時也

古書論說猪癰羊癰等類皆因像立名為飾文其實陰陽一證也

論癰狂癰瘕

癲狂病始本於心者精神之舍智慧之源泉欲安解無請  
解其病何及焉蓋邪積於內熱傳於外脾胃因虛不能克制腎  
水上刑於心火陰陽併居遂致精神失守恍惚多驚癲狂漏瀝  
之疾所由而生蓋重陰則癲重陽則狂病則身軟而醒癲則身  
強而溫癲之來也發則異常或歌或哭乍喜乍悲狂之證也妄  
言不食而歌晝夜而走癲者發則口吐涎沫或作諸聲癲  
則腰背仰折狀如反弓痰壅而厥良由風涎流滯心絡故也已  
而失治損傷於心心傷則神去神去則死矣設有安者則語澁  
少神或緩弱為癡八

癲狂嘔喜

重陰相勝必為癲

嘔喜無時面目鮮

陽盛兩爭強自作

或戰或寒或驚或眠

或驚或寒或驚或眠

只為胸中聚毒痰 更被醫士重疊取

驚風不定後相傳

兩眼有如羊不睡 更加目睛定不安

大衝有脈猶堪治

如沒大光不請言

驚風三搖後成癇

醫末牙關目上翻 明辯陰陽參色脈

不拘輕重總風痰

潮來仆地口流涎

嚼舌唇青眼鼻拳 頭顫手裡痰涎壅

朝昏退醒復依然

慢驚雖在後

涎毒溢難收 發熱成癇疾 精神不自由

胎中驚喜怒

傳作證多端 向赤咽喉響 唇青吐沫痰

睨睛胸疊起

牙緊氣難覓 狂走無時節 頑涎積胸間

風邪貫心竅 欲發臉如蘭 瘕瘕隨方出 羊癇目白眩  
昏昏常不醒 泥土亂朝食 日久癇難差 出痛感作痛  
舌縮胸前脣 通身汗不乾 口開肢體瘦 頃刻入黃泉  
大汗不止 皮鼓黑色 口開舌出 身體冰冷 胸膈聲絕  
心下脹起 逆喘不通 羊睛血脈 項軟瘰癧

五臟癲癇

犬癲反折上竅犬叫肝也 羊癲目瞪口舌羊叫心也  
牛癲目直視腹脹牛叫脾也 雞癲驚跳反折雞啼肺也  
猪癲如尸吐沫猪叫腎也

五癲重者死病後食者亦死

癲者小兒之惡病也或有不求醫而致困者也然氣發於內

必先有候當直審察其精神而採其候也

手白肉魚際脉黑者是癰候魚際脉赤者熱

脉青大者寒脉青細者為平也

鼻口乾燥大小便不利是癰候

眼不明上視喜陽是癰候

耳後完骨上有青紋臥不靜是癰候青脉刺之令血出也

小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癰候

鼻口青時小驚是癰候

目閉青時小驚是癰候

身熱頭常汗出是癰候

身熱吐衄而喘是癰候

昏瞶目時直視是癰候

喜大目上視是癰候

身熱目視不精是癰候

目瞳子卒大黑於常是癰候

卧惕惕而驚手足動搖是癰候

卧憂笑手足動搖是癰候

意氣下而妄怒是癰候

咽乳不利是癰候

身熱小便難是癰候

吐利不止厥痛時起是癰候

弄舌擗頭是癰候

諸癰危證

目直無聲 目睛不轉 眼生白膜 眼慢唇黑 瞳人瞬動  
眉間色青黑 面青指黑 口中涎沫如白膿 口噤吐脹不  
乳 喉如鋸聲 多睡不乳 身熱下血不食 身體痿軟不  
醒 腹滿虛鳴 厥逆而痛 吐利不止 汗出壯熱不止  
臥久不寐 癰瘡身體反張 大人脊下容側手小兒脊下容三  
指並不治 諸癰僵直什搐掣但扶持之謹勿把捉  
大之散 治嬰孩小兒胎癰正發未分差後

天漿子沙

全蠍稍心二十箇

防風去蘆叉

天麻煨

辰砂五錢

麝香一字

右爲極細末用乳汁調化不拘時服

安神散 治驚風 疳積 癰疽 安心 心

茯苓 白鮮皮

人參 遠志 石膏

犀角 甘草

右判散用麥門冬去心同煎不拘時候服

獨活散 治嬰孩小兒風癰解表通裏內熱

獨活 麻黃 川芎

天麻 防風 細辛

荊芥穗 甘草 大黃

右咬咀用生薑三片同煎食前服

化風丹 治嬰孩小兒風癰



天南星牛膽製 天麻煨 羌活去蘆

獨活 防風去蘆 人參去蘆

荆芥穗 川芎 甘草炙各一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化或紫蘇

煎湯食遠服

風瀉湯 治嬰孩小兒風瀉痰熱相感而動於心風痰相感則

煩悶無知口出涎沫或禁不言身反目直

竹藤 地黃生 防風去蘆

薑生 麻黃去節各 防己

附子炮去 桂枝去皮 錢石膏二錢半

龍腦生

右割取用木煎不狗時候服

鐵粉圓 治嬰孩小兒顧發無時心悶吐沫

龍齒粉

輕粉

天麻

天南星 牛膝 各三錢

沒藥 二錢

牛黃 一錢

麝香 半錢

右臘日或端午日為始細末用水煎如梧桐子大煎

湯研化食遠服先服人藥之際取水之時切忌不得語

女小兒雞六指見靜安亦可

大寶丹 治嬰孩小兒驚風熱發癇狂言識語如見神鬼大

則行走如飛不可止

羚羊角

犀角

玳瑁

琥珀

防風各一錢

茯苓 去皮

天南星 生製

甘草 炙各一錢 辰砂 水飛一錢半

麝香

龍腦 各半錢 金箔 三十片

右為細末 杭米 薄糊固如灰 實大盒 看為夜用 薄餅煎

湯研化不拘時候服

猪膽南星散 治嬰小兒癩後瘡不能言

天南星 生製 薑汁炒

右為極細末 用雄 猪膽汁調化 食遠服

牛黃膏 治嬰孩小兒風癩迷悶 抽掣涎潮

天南星 生製

全蝎 去毒炒 蟬蛻 去足各一錢

僵蠶 去黃 白附子 生法 防風 去蘆 義

天麻

蘇合

右為極細末蒸棗去皮核取肉同和水銀一角研入藥末

如小豆大用荊芥穗生薑同煎湯研化食遠服

洗浴散 風截頭

薄荷三兩五錢 防風去蘆二兩五錢 荊芥二兩

石膏 梅根各一兩

右為羅末每用三匙水二碗煎五七沸適寒溫浴兒先洗面

後浴身體遇風處佳

痘疹痘疹字異義同

楊氏曰發痘證候由先傷於風又感寒濕致之此虛極生熱熱極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆醫士不開汗

之必發症濕家發汗稍多亦發症項背強直腰身反掣頭掣痛  
癢噤口不語發熱腹痛鎮日不醒其壯可畏病在足太陽經剛  
症無汗柔症有汗其面紅眼赤牙緊口張痰涎壅盛身清煩渴  
小便赤色先識語而發者此剛症也其次大便滑泄不渴不語先  
手足冷而發者此柔症也剛柔二症亦如陰陽陽陽陽陰之類  
剛症為之發汗柔症為之解肌證治有法醫士圖之

治法先與消痰順氣為上同是病勢稍止然後審其熱之輕重  
而解利之熱輕者散毒散熱盛者小柴胡湯壯熱胸滿口噤咬  
齒而大便秘結者是為內實大承氣湯下之得利以來無汗用  
麻黃按方有汗則麻黃謹勿用也其若痰寒氣盛則大南星半  
夏茯苓以消其痰枳實陳皮紫蘇以順其氣痰清則風止氣順

則神醒則瘧為之除肝火盛為之解肌理最難痊十救其一  
三日不治

瘧則身強直 瘧則足冰冷

瘧病強直

強直反如弓 神昏似 風涎流唇口動 瘧瘵瘵同

小兒瘧瘵病停中 氣 心腹閉不通 乳食有時開口傾

情俄顛顛少舒容 曉 驚如搖扇 目睛主虧似癰風

自臍胸疊剛柔瘵 細 陰陽始見功

石剛瘵有熱服小柴胡

石剛瘵胸滿內實口窒 藹服六承氣湯

石剛瘵無片服麻黃湯

石桑連有汗服桂枝湯

治桑連厥冷自汗服理

治桑連自汗肢麻厥冷服

防風溫膽湯 治嬰孩小

半夏 溫胆湯一藥

橘紅 去白

右制散用生薑三斤紫

麻黃為根湯 治剛痊無

麻黃 去節

未為藥

葛根

故

右剉散用葱白一根同煎不拘時候服

治霍亂腹氣三式

小兒 去皮各五錢

風 去皮各二錢半

甘草 炙一錢半

桂枝有根湯 治榮經有汗

桂枝

赤芍藥

甘草

葛根

右剉散用生薑三片棗一箇去核同煎不拘時候服

至聖散 治嬰孩小兒中風瘳病昏悶不醒

全蝎尾

去毒二箇 晚蠶蛾

天漿子

白附子

炮各五錢

辰砂

水飛一分

麝香

一分

右為極細末用薄荷煎湯入酒二三滴調化不拘時候服

中風

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則感熱蘊蓄於外則發理虛開致風邪自背上五臟俞而入乘其外虛而暴中之其



昏不知人壯熱狂燥搐掣氣盛口噤痰潮必有五臟中風之  
蓋風寒暑濕亦能中人是也

氏曰小兒多因感風久嗽不能發散致風邪入肺臟之絡遂  
肺風口能視人目不能言是其候也

氏曰是風也始入於皮膚次達於經絡而搏於筋脈風入額  
頰之筋則口喎而牙緊風寒咽喉聲啞之因則牙不出而舌  
與氣搏氣以痰隔則喉間如射船之響搏於筋脈則筋拘  
筋痛筋必浮緊得熱則緩弛不隨筋必浮洪風寒則筋  
急風夾熱氣即緩弛宜追風毒坐散大抵脈浮病在表脈沉病  
在裏脈促病在上在表宜發散在裏宜疏導促於上則脈浮  
者宜吐之若虛寒者附子川烏不可缺古入治法以類從之

其皆消息權度而投焉

宋氏曰治風先理氣不可專服風藥攻之愈急則風勢愈甚且調理氣活血和平榮衛調陽則風疾不治而愈

楊氏曰中風者人之驟病也一時倉卒若未能精審五臟受證且先與搐鼻開關豁痰下氣蓋諸中風皆因痰鬱氣滯而作痰消氣下病勢稍蘇然後辯證

治風先理氣良劑小續命湯為上排風湯次之然一藥主風不主氣須以人參順氣散為藥順氣散佐助其順氣一流行則風自疎散矣順氣則蘇合香團南木等藥治痰則白圓丁六兩是半夏可用如銀粉鈔等謹勿妄施寒毒入胃則血脈凝滯真氣銷鑠而成廢人俗謂熱則生風者則天雄附子桂川烏不可

缺也

巢氏病源曰小兒中風之證肝中風則踞坐舉頭不得若唇青  
面黃急治唇黑面白少治心中風則但能仰卧頭側不得若汗  
出唇紅急治唇黑面黃不治脾中風則腹滿而身重若吐清酸  
水可治面青足冷不治肺中風則偃卧而胸滿喘急鼻閉不通  
人事面白急治面赤不治腎中風則目黑而腰疼若兩脇未育黃  
色急治齒黃髮直面如土色不治此五臟所中之證若用藥差  
則的成顛癇也

中風惡病細推求 口噤須逢脈數尋 眼合不開并竅閉  
面排面黑難收 口張吐沫氣壅大 髮直搔頭汗不流  
軒軀喉鳴垂鼻冷 遺尿瀉血並皆休

先以猪鼻糊開通鼻迎響者即愈不響者不治

皂角煨去灰

細辛去葉

天南星去毒

半夏去皮

右為極細末用小蘆管盛藥末吹入鼻中牙關緊者用梅鹽梅去核同藥末擦牙加麝香一字

吐逐風痰

猪牙皂角二片炮去灰

玄胡索去白

青黛二錢

右為極細末用新汲水灌

掃涎散 治嬰孩小兒中風昏悶

猪牙皂角一條去黑皮

礞石二錢一分

輕粉 一字

石為極細末用溫水調灌服不致大吐但微出冷涎二三

便醒

瓜蒂散

治嬰孩小兒壯實者可用治風痰壅塞諸藥化不下

者

甜瓜蒂為細末加輕粉半字清水調灌服良久痰自

出合沙糖一塊下咽即吐

小續命湯

治嬰孩小兒剛柔及不分之症中風

麻黃

去節

人參

去蘆

黃芩

炒

杏仁

去皮尖炒

川芎

芍藥

炒

甘草

炙

防已

桂枝

去皮各五錢

附子

炮去毒反

風

去蘆又十錢

錢半

剛強

用麻黃

桑寄生

剛柔不分加

附子生

大便自利厥冷加附子炮

右劉散用生薑

三片同煎食前服

相風湯 治嬰孩

小兒中風邪氣入於五臟狂言妄語手足不

仁痰涎積盛

白蘇皮

白朮

白芍藥炒

當歸

地黃

桂去皮

川芎

杏仁

炒

甘草炙

獨活 去蘆

麻黃

炒

茯苓 去皮

右劉散用生薑二片棗一箇去核同煎食遠服

人參順氣散

治小兒感風頭痛身熱聲重中風疏通氣

直氣後服風藥

川芎

桔梗炒

白朮

白芷

陳皮去白

枳殼去穢麴炒

甘草炙

麻黃去節

人參十五厘

白薑炮

烏藥

方剉散用生薑三

片棗一箇去核

煎不拘時候服有熱去

白薑

獨活湯

治嬰孩小

驚癇鶴膝及止

風濕日久致腰背手足

疼痛日輕夜重四肢

痿痺不仁

獨活

片薑

錢當歸酒浸炒

白朮

黃耆炙

桂枝去皮

牛膝酒浸各二錢

甘草 各一錢

右咬咀用生薑二片雞白一棧同煎食前服

驅風散

治嬰孩小兒卒暴中風全不能言口眼喎斜驚風抽搐

型痰實煩悶神昏有熱睡卧不穩

防風

去蘆義一兩半

天南星

生去皮

甘草

生

半夏

生薑製一兩

黃芩

炒各一兩

右咬咀用生薑三片同煎不拘時候服

三生飲

治嬰孩小兒卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂痰

飲氣厥

天南星

生去膽

川烏

生

半夏

生去膽

木香

各一錢



右剉散用生薑五片同煎調蘇合香圓自然汁擦牙不拘時

候服

疎風散

治嬰孩小兒五臟中風昏體不能自收冒悶不知疼

痛口不能言筋脉拘急手足抽掣

防風

去蘆義

犀角

麻黃

去節

當歸

去尾蘆

川芎

羌活

去蘆

人參

去蘆

遠志

去心

茯神

去皮木

甘草

炙半錢

石咬咀用水煎食前服永除根永不復發

百部圓

治嬰孩小兒肺中風

百部

炙五錢

杏仁

去皮尖炒

麻黃

去節

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用鹽湯下於淡茶中飲

白圓子

治嬰孩小兒驚風中風痰盛

白附子炮

天南星

去腐炮

半夏

生去腐各二錢

天麻煨

全蝎

去毒炒

殭蠶

去嘴絲炒

川烏

去皮尖煨各二錢半

右為極細末生薑汁煮麴糊圓如黍米大用生薑煎湯不拘

時候服

白圓子

治嬰孩小兒驚風中風

天南星

去皮

白附子

生各

半夏

去皮

川烏

去腐尖皮

生五錢

右為極細末以生絹袋盛用井花水攪末出者更以手揉令  
出如有滓更研再入絹袋攪盡為度故磁盆中日晡夜露至  
時藥水別用井花水攪又晡至來日早再換新水攪如此春  
五日夏三日秋七日冬十日云水晡乾後如玉片研細糯米  
粉煎粥清圓如黍米大用薄荷煎湯不拘時候服

蘇合香圓 治嬰孩小兒心腹刺痛啼叫不止或中邪氣或衝  
客忤驚氣入腹夜啼齒痛面色不定辟邪氣瘟疫除癰霍亂中  
風五積噎病痰癖氣塊狐狸鬼魅狐魅鬼疰吐瀉痢證

蘇合香

酒熬膏

乳香

朱砂

水飛

安息香

酒熬膏

人參

白木

沉香

青木香

檀香

丁香

香附子炒

犀角鎊

昇澄茄

呵梨勒炮去核麝香二錢半

龍腦一錢

右爲極細末除安息香乳香用酒浸透研成膏與蘇合香

湯瓶內蒸透同入藥末煉白蜜圓如芡實大用熱湯研化不

拘時候服

蘇合香圓 治證同前

蘇合香

乳香

龍腦各一錢

白木

丁香

朱砂水飛

青木香

檀香

沉香

犀角鎊

安息香

香附子炒

阿梨勒

炮去核

麝香

星撥

各二錢

右為極細末同煎藥修合

小兒驚風

治嬰孩小兒傷風發搐及慢驚脾風鼻流清涕中風

不醒人事

天南星

燒存性

川烏

去皮尖燒存性

玄參

去蘆四錢

薄荷葉 四錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化不拘時

候服有蘇沈良方但天南星川烏各一箇薄荷玄參各五錢

烏犀膏

治嬰孩小兒驚風中風發搐化痰退熱

薄荷葉

烏藥

燒存性

京墨

三錢

鵬砂 三錢

麝香

朱砂

水飛

玄精石

猪牙皂角 各一錢

方為煉銀末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化入藥汁  
一瀉小

積

古人有言不盡意者非失言也如用資功不可得而著乎紙筆  
之間且學者初機未可使得純粹廣見之謂識開通心智口  
然運出狀後可謂之醫在意也此科最難為醫者最要緊  
今病家將作尋常醫士不至急切求之者蓋因病之有緩急及  
至傳變方覺困重之務求心信乎

東漢王氏不言與瀉及痢即速證而已所證治法之精也  
小兒有自幼及長不患驚風潮狂癲癇者有之矣未聞無患積

證者謂五臟之所積名曰積六腑之所積名曰聚。小兒只理  
五臟受病故不有六聚候者何。腑屬陽雖有積不治而自愈。且  
胃候腑氣生以漸乃脾主食有疾當治之。雖屬小兒治之尤難。謂  
治四季有積欲下之理。實可用藥但與寒寒虛寒後利之既  
有積氣不能全盡。量其輕重故古人有積重難消積化情無  
不積之說。是知積之一證不可真誤。獨下其積虛極先和氣  
胃令其克實。次與推下若積證一二三併作之者。可先下而後  
調胃。藥服稍用倒置不免為它咎。乃計利害所議。積證作寒  
與之安和一味。當下斯為良法。有積不可安。安人則為它病  
雖痞癖請先宣定去寒熱寒熱已去方可換下以通氣。下之  
太過及生重熱雖有重熱即不宜用涼藥。乃於通理胃氣藥與

治之尤宜深究無令得失

卷八

積聚之因蓋由忠怒生冷麵食肥滑積聚之物停於臟腑屬陰陰氣不行蓄積一處不動故曰積聚屬陽陽氣運轉不定遇上即聚故曰聚積之候面黃虛腫面赤而目小便如油腹脹虛鳴頭髮焦黃下痢赤白兩眼黃赤滿身虛腫昏困多睡者是也若面白喘急面黑眼直口出熱氣手腳心生瘡乾咽不食瀉注入瀉腹急如鼓項軟口噤手足俱細則難治

經言病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽伏而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生也聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始



發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚故以是別知積聚也

楊氏曰止以三積論之治積不得峻取

食積者乳食無度多飧過飽飽而便晦腹脹

其證吐硬而熱痛瀉吐乳

乳積者啼叫不已便乳兒痰氣結聚停滯不化

其證吐乳瀉乳其氣酸臭

氣積者乳母怒氣觸忤兒食氣乳停滯不化

其證腹滿啼叫瀉痢如蟬蛻

湯氏曰論五積乃風積肝積食積疳積驚積

乳積

吐乳瀉乳其氣酸臭因啼叫未已乳哺停滯不能得

食積

肚硬帶熱瀉瀉或嘔因飲食過飽飽後腫脹白腹浮

氣積

腹痛啼叫痢如蟬渤因觸忤其氣禁衛不和日久得

虛積

渾身微熱或冷不思乳食昏睡或頭圓手足攣肚浮腫乳食不  
化

實積

壯熱發硬身熱而渴嗜食善飢

積痛

口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積藥治之

積證有傷乳傷食而身體熱者惟肚熱為甚日夜間有熱者傷積之明驗也

驚積

小兒驚積本因痰

壯熱肝心兩臟停

潮熱面青痰中響

速與涼脾利下涎

大腑無時泄下青

見人啾唧似生真

解驚去積宜施劑

互效精神起卧寧

傷積

頭痛身熱腹微脹

足冷神昏只愛眠

因食所傷脾氣弱

下宜遲緩致為尤

而黃目白少精光

多脂齒而被食傷  
嘔逆出聞酸氣息

時時腹滿陣難常

腹脹時時好覆眠

髮黃敗赤吐并宣小便

更無瀉下腸鳴

甚去積消積立見痊

夏日食瓜果

肥疳積不將

病因多積熱

秋後剝難當

傷寒餒腹臭

兼疳瀉白肥

積滯物不化

結食又還稀

食瀉重當取

疳虛要補虛

再傷宜再取

何患積難除

### 食積熱

究源曰小兒臟腑嬌嫩乳食易傷脾胃虛冷不得剋化

其證有面目腫肚熱腹脹多困多啼乳食減少夜熱薑涼

下糞較臭不穀不化便秘無禁

嬰孩食積熱 氣急不尋常 寒熱常如瘧 瀉渴要呼禁

眼澁頻堆腫 登便更滑腸 睡安合地睡 此是積爲傷

脈實氣口緊感辨其虛實虛宜補實宜取

小兒五積候 還因乳哺成 先從腹肚脹 次後面虛形

多端面作地 小便似油清 髮直無毛堅 眼黃是積名

白痢更兼赤 吐逆腹虛鳴

虛積熱

若患虛積熱 渾身熱又羸 脚手背看細 肚急硬如吹

見食還增愛 瀉渴糞如脂 終日無懼色 唇紅不可醫

積熱

積傷腹痛泄澀  
當急延高乳食稀  
瀉利不常類後熱  
百重虛補物傷

傷積新熱

新熱多因積在脾  
瀉如星樣又即止  
潮來髮肉汗煩  
煩渴便黃更煩  
此因轉虛其熱甚  
涼心此患自然離  
有他耳時氣形候  
青者熱風亦熱瀉

驚恐食傷

作瀉不甚驚  
或吐又不吐  
乍熱乍瀉  
小使遺難  
大便物不聚  
驚疳與食傷  
腹前躁乳哺

乳食類傷

乳食若類傷  
驚痰亦為積  
吐而臭酸醒  
瀉多急氣急

張病脈虛弱 瘦黃消瘦 或倦或嘔 不眠不安 動則

寒熱因積

壯熱寒時又卻寒 皮膚燥熱髮毛 非下脾是為邪祟

取下脾間積始安 通利下寒熱生 腹脹生寒 下之即安

即寒

食停中脘

食停中脘內 嘔逆氣難通 不瀉特為痛 生痰必引風

食物不化

食物難消化 脾間有積停 腸腹脹作瀉 進退不安寧

因飢傷飽

因飢傷太飽 氣脹腹膨時 渴汗并黃熱 噎膈不亨行

腹大非飽

腹大非干飽 多食只是飢 甘涼常消熱 肌體致旺羸者

不知飢飽又不食肌肉消瘦大便必精液由腸胃不守故也

百種地瘠

傷暑傷脾食 心煩腹中脹 腹膨脹渴燥 土與濕相連

虛實腹脹

腹脹皆因食積傷 虛而傳滿瀉相連 朝實暮虛此虛實

虛腹自溫是胃三

積腹脹脾

因食候傷脾 肌膚壯甚大 腹膨多氣促 瘕瘕腹無疑



積熱虛腫

積在脾中熱不通

至令臉赤又唇紅

胸膈氣急壯熱大

黃瘦今其動肺風

喉裏作聲不止壅

熱即腫起熱來衝

只消涼却心中病

三日之間見妙功

積病可醫

面上虛腫是積

面合地耳是積

小便赤澀是積

腹脹是

積 髮黃是積

赤白痢是積

兩眼黃赤睛言是積

遍身

虛腫是積

多瀉白赤者是積

積病不可醫

喘急是肺積

面黃赤是腎積

吐熱氣熱積

手腳心生瘡疥

積 惡心吐乾嘔胃積

瀉久住入瀉積交皮爛

痞

痞

音甫又音婢

傷氣得之心腹膨脹肚大脇滿痛刺往來注在左

肋而著肌瘦倦怠無力久而不治漸在痞塊又曰氣塊痞者塞

也結者實也熱氣蘊於胸膈之間留飲聚於腹脇之內於是榮

衛不得流行臟腑不得宣通由脹滿而至痞結就使然與此

實之證

痞似結胃

證同前證應無痛

病在陰經下甲虛

邪毒結留心下滿

此名痞氣胸中居

脾氣

辟積傷積得之其證如腸辟之疾便利無度滑不成糞似刺非

痢似蟲非蟲腹肚乾痛上築心胸滿悶久而不治頑結不散後  
結成塊有類漆狀

楊氏曰小兒乳哺失調二焦闕格以致水漿乳哺停滯腸胃不  
能宣行今氣結聚初得成積久則血膜包水時時作痛或爲潮  
熱或生寒熱及疳家多於中脘蓄積黃水日久結癖寒熱不已  
幼幼方曰由脾胃虛冷乳食積滯不能剋化以致血膜頑痰聚  
積而成癖

湯氏曰小兒食積其壯在右脇時後泄心多驚啼乳癖在心時  
或上下疼痛嘔吐發熱疳癖在脇下如水梳子痞癖在右左脇  
多啼惟驚積在心頭不動因驚積而得痰涎聚癖不動多啼者  
於取積藥中不問是半夏麤化痰之劑實者取而後補虛者補

而後取

小兒癖者血膜包水解則於過傍時時而作痛也惟癖爲能發潮熱生寒熱故瘧家中脫多蓄黃水日久而後結癖寒熱之不已者以此小兒臟腑和平禁衛調暢則津液自然流通縱使多飲水漿不能爲病惟夫乳哺失調三焦開格以致水漿停滯腸胃不能宣行冷搏之於是結聚而成癖

小兒癖積久則癥瘕疼痛隨之嘔臭酸餒寒熱間作心膨肚脹胞浮黃癯虛實治之

小兒癖證在脇膜間亦虛中之積先寒後熱飲水不食以致喘嗽證

錢氏小兒以癖爲潮熱治法解飲寒熱即與下癖痞亦在左右

陽明病陰

腹中不和

小兒疳積由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水或喘嗽與潮熱相連不早治必成疳以其有癖則令兒不食致脾胃虛而熱發故引飲水過多即蕩滌脾胃亡失津液脾胃不能傳化水穀其脉沉細蓋不食脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳

虛癖

小兒虛癖積者有實中之虛虛中之實補下快當細詳藥有諸癖及死候不治

愛歲酸餒息 昏昏顛語言 兩補寒熱作 乳食少曾食  
胞臉浮黃色 心膨腹不寬 臍中停積滯 疎利五輕安

虛癰豈無因

昏昏似顛形

晡時溫熱作

更夜渴方慍

面頰浮青白

酸餽臟腑停

日深加足冷

寒熱轉相親

癰疽痞癰積因傷

腹脹筋

目面色黃

發熱有時加更渴

不然舌上又生瘡

本因積久成頑結

男左女右居腹脇

俗云龜癆不須聽

化癰調脾白安帖

堅積癰塊有多端

元因乳食聚脾肝

或即橫痃連腹痛

無時隱見臍間安

虛癰潮熱未退

發熱頻頻氣若濡

因傷積滯未消除

口乾唇白多煩渴

不食痰生胃轉虛

瘵積死證

澹心頻刺痛 氣短喘加煩 滿肚盈如鼓 皮焦瘡紫斑  
唇臉始藍色 臍連脇硬橫 瘵瘵諸積證 死候其醫者  
青紫 吐痰黃水 目眦紅血 肚滿如胞 皮焦黑點  
舌乾唇縮 心下赤浮 兩脇白爛 腎陷自瀉  
面黑瀉黑 久瀉不止 吐瀉交作 腫肚脹滿 氣出鼻大  
手心生瘡 瘦弱柔軟

一切瘵積候變作死證

面紫黑氣喘涎壅肚脹如鼓服藥不利  
腹中刺痛湊心忽瀉下鮮血口唇舌黑縮  
肚痞脹上生小黑瘡自刺面青多

手足心忽腫起發反熱口鼻吐出青黑血

作寒熱日久體虛忽發搖不住面青口伴涎出

肚腹臍出熱盛刺痛面青吐瀉出蟲

紫園子 治嬰孩小兒乳哺失節宿滯不化腹脹痞滿嘔吐惡

心便利不調乳食減少又治傷寒溫壯內挾冷實大便酸臭乳

食不消或以待汗身熱不除及變蒸發熱多日不解因食成痼

先寒後熱

代赭石 醋煨

赤石脂

煨各

杏仁

去尖尖殼

巴豆

一錢淨洗巴豆取仁二錢重去膜心出

右除杏仁巴霜外研為極細末入杏仁巴霜同藥研勻水浸

蒸餅圓如黍米大兒生三十日外服一圓用乳汁或米飲亦



得微利則差

千金云無所不治雖下不虛八

消積圓

治嬰孩小兒中脘停食不消吞酸惡心口吐清水心

腹刺痛後泄如痢

烏梅

去核七箇

白芷

三錢

巴豆

去皮心油二箇

杏仁

去皮尖炒

半百

去腸湯浸

縮砂

去殼二十一箇

右為極細末煮麵糊圓如黍米大每服三五七十圓用生薑

煎湯食前服

下積圓

治嬰孩小兒乳食停積心腹脹滿三焦痞塞嘔吐泄

瀉

丁香

縮砂

去殼各一箇

史內子

去殼五箇

藥性論云：三石脂，味甘，平，主下痢，去油，一升。

右為極細末，以水飯圓，如藥餅，以酒煮，煎湯食前服。

七聖散：昨，黃連十兩，水一斗，煮四。

三石脂：黃連，水一斗，煮四，去殘炒。

兩石脂：川楝子，水一斗，煮四，去皮炒。

羌活：水一斗，煮四。

右先用醋浸羌活一宿，少漸乾入一砂，連沙同炒赤色入。

青皮、橘皮、川楝子、杏仁、三石脂末，共研細圓如赤米，大用。

白湯食遠服，日間所食之食物盡行消化，永無積癖。

快膈消食圓：治嬰孩小兒宿食停滯，腹脹疼痛。

三稜：蓬莪朮，細沙，去殼。

橘皮 去白

神麴 炒

寒藥 炒至三錢

香附子 炒一劑

右為極細末蒸餅圓如黍米大用生薑煎湯或白湯食後服  
看輕重却用下積藥一方加枳殼麴炒一錢

消積圓

治嬰孩小兒積聚寬腹脹退面腫進飲食化滯物

木香

人參 去蘆各一錢半

黃連 炒去鬚

蓮肉 去心各三錢

橘皮 去白

青皮 去穢炒

丁香 上二錢

右為極細末用麴煮糊圓如黍米大用米飲食後服

五積圓

治嬰孩小兒疳勞諸積

天南星 炮去腐 風積

鑄金

桃穢

桂去皮

麥穢

史君子去服

殭蠶去嘴絲炒  
各三錢

巴豆去心油

食積

右為極細末蒸餅圓如赤米大用蘿藦子煎湯合服

香稜圓治嬰孩小兒消積聚癥塊

木香

丁香

各一錢半用酒煮炒

枳殼去穢類

青皮

去穢炒  
三錢

蓬莪朮

細切用巴豆七箇天殼同炒  
巴豆赤色不用巴豆各一錢

三稜圓

治嬰孩小兒癖積消積進食

三稜煨

蓬莪朮炮

神曲炒

麥蘗炒

青皮

去穢炒

陳皮

去穢炒

右為極細木煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

香稜圓 治嬰孩小兒積氣發熱肚腹脹脹絞絞體瘦弱飲食不進

瀝肌膚

木香

丁香

檳榔去腐

枳殼去穢

官松

文唐子去取

神麴炒

麥蘖炒各一

二按慢

蓬朮炒

青皮去穢

陳皮去白

香附子炒

胡黃連

右為極細木煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

煨積圓 治嬰孩小兒積氣發熱肚腹脹脹絞絞體瘦弱飲食不進

心便利調乳食減少者痰涎壅塞大便酸臭等症用此藥

食退黃長肌

三稜煨

丁香 各七錢半 乾薑 炮半錢

巴豆 去皮心 油七箇

青皮 去穢炒 丁香 各二錢半

右為極細末醋煮麵糊圓如黍米大用生薑煎湯入之服之

藥不用大黃硃砂赤粉之類並是性溫之藥

七香圓 治嬰孩小兒溫中快膈化積和氣嘔逆食噎疳積

積

甘松 一兩六錢 益知 去殼一兩二錢 香附子 炒二兩四錢

丁皮 甘草 炙 蓬莪朮 煨

縮砂 去殼各四錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大用生薑煎湯食遠服

長生圖

治嬰孩小兒寬上實下補脾化痰

木香 二錢半

檳榔 去脂

枳實 去穢炒各五錢

半夏

去脂湯泡七次

丁香

縮砂

去穢

肉豆蔻

麝香 去油各一錢半

全蝎

去毒炒十箇

右為極細末白米飯圓如黍米大用米飲不拘時候服量兒大小以意增添圓數

鶴頂丹

治嬰孩小兒傷乳食發熱咳嗽食積腹脹疼痛痢疾

大便秘結

半夏

去脂湯泡七次

杏仁

湯泡七次去皮尖

巴豆

去皮心酒洗

右為極細末成片入乾腦脂半錢用烏梅浸水麵糊為丸

米大用生薑煎湯吞服

肥兒圓

治嬰孩小兒脾瘕痞積黃瘦肚大口臭好食泥土消

蟲進食

胡黃連

神麴炒

麥蘖炒各五錢

檳榔

去脂一箇木香一錢

肉豆蔻麵裹煨去油

史君子

去脂各一錢半

右為極細末蒸餅圓如黍米大用米飲食送服

福圓

治嬰孩小兒陰陽不和驚風怯弱乳食不消心腹脹

滿食嘔乳癖痞結冷痛嘔逆氣急腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛積

聚腸胃或秘或利頭面浮腫不思乳食五種疳氣八種痢疾肌

肉消瘦氣羸腹大神色昏憤情意不樂散冷氣調臟腑進飲食

蘿蔔子

炒五錢陳皮去白

青皮

去穢炒



三稜 煨

蓬莪朮 煨

黑牽牛 各二錢半 炒用頭末

木香 半錢

胡椒 錢

右為極細末黃麵糊圓如黍米大用生薑煎湯食遠服

三稜散

治嬰孩小兒氣積腹痛消乳食

三稜 煨

蓬莪朮 煨

甘草 炙

益智 去殼

青皮 去穢炒

陳皮 去白

神麴 炒

麥蘖 各二錢

右為極細末用白湯調服不拘時候服

丁皮散

治嬰孩小兒脾積夜痛

丁皮

白朮

茯苓 去皮

青皮 上蜜炒

陳皮 去白

烏梅

神砂去麩

神麴炒

麥蘖炒

甘草炙

桂去皮各半錢

右為極細末用燒餅湯調化食遠服

安胃和脾散 治嬰孩小兒脾胃不和腹滿氣痞嘔吐痰逆噎

氣吞酸面黃肌瘦腹脹筋刺瘰癧利不調乳不思乳食不化

蒼朮去皮重製炒黃色二兩

人參去蘆

白朮

茯苓去皮

青皮去穢炒

陳皮去白

藿香葉

縮砂去殼

二陳爛

蓬萊水罌

檳榔去穢

澤瀉

甘草炙

厚朴米泔水浸上炙

錢

東去核焙二十四箇

右為極細末用生薑煎湯調化不拘時候服

消積飲 治嬰孩小兒脾虛冷不能消化乳食致成瀉利冷氣

和氣產後產積以類調脾進食

縮砂 錢半 陳皮 去白 一錢 桑葉 香附子

丁香 甘草 炙各一錢 香附子

荷葉 麥蘗 生 三稜 炮

蓬萊水 蒼耳 米泔浸 厚朴 去皮炒

青皮 去穢 枳殼 去穢 神麴 炒

石菖蒲 細末 用米飲調化食前服或冬瓜子 炒

散

散 治 傷食 胃之 損 乳 肺 肌 心 胸 煩 悶 飲 食 不 下 嘔 吐 泄 瀉

久不醫漸成癥結又曰食結

癥

癥音加

傷血得之胸膈鬱悶痛引少腹時或攻築上衝心腹

雖不阻食肌肉不生久而不治漸成癥結又曰血結

小兒癥瘕者臟腑之內久積聚令兒腹內有塊癥者定一處不動瘕者腹內去來不定也

癥瘕痛乃久積所致亦能成疳此皆禁衛俱虛外則感受風寒內則過傷乳食停滯既久不能化故邪併於陰為癥陰則專靜凝而不移邪併於陽為瘕假物象形動而不息蓋此二證若久而不治亦成脾疳積或兩脇間有塊如石按之則痛不按則輕或面黃肌瘦肚硬而脹及有青筋晝涼夜熱蒸潮無曉乳食



北柴胡

去蘆二錢

人參

去蘆

木香

枳殼

去穢類

二稜

煨

檳榔

去穢各

錢半

赤茯苓

去皮

甘草

炙各三錢

右咬咀用生薑一片同煎不拘時候服身體瘦瘠加棗去核

一箇如熱甚汁多加黃耆蜜炙三錢

腹痛

楊氏曰俗謂脾家疼痛出於胃虛不究病源多用和緩等劑以致掩散邪氣蓋腹痛多因邪正交爭與臟氣相擊而作也受證非一夾熱痛者壯熱面赤或四肢煩手足心熱藥宜因順飲加青皮去穢炒枳殼麩炒夾食冷痛者面白或青甚者面青唇青瓜甲皆青藥宜理中湯冷熱不調邪正交爭宜枳殼湯加青

皮陳皮去白木香丁香桂當歸去蘆炒有積傷脾則面黃腹脹  
夜熱晝涼宜紫圓子去其積風冷入脾則脾胃積冷中滿之痛  
甚再歲月不可測識藥且拙刀散以伐其積脾開則熱則平  
作乍止嘔吐清沫藥宜檳榔圓主之知此通一車為大痛止繼  
以養脾之劑療病如濯衣去其垢汚方加漿餅借此為喻  
枳殼湯

枳殼去穢麵  
雙炒

青皮去穢炒

陳皮去白

木香

丁香

當歸去蘆炒

縮砂去殼

右為極細末用燒鹽湯調化食遠服

奪命拙刀散 治嬰孩小兒脾胃積冷腹肚疼痛

乾薑 巴豆半錢同炒黑去巴豆 良薑 斑蝥十箇同炒

糯米 炒二兩半 石膏清 二兩二錢

右為極細末用生薑煎湯調化食前服

定息香圓 治嬰孩小兒腹肚疼痛由出而啼

安息香成膏 沉香 木香

丁香 八角茴香 藿香葉各三錢

香附子炒 縮砂去殼 甘草炙各五錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用紫蘇煎湯研化食遠服

瘧

楊氏曰風寒暑濕邪自外來飲食居處邪由內作又曰豈特夏傷於暑秋必瘧瘧哉古人以暑受病最多言之爾夫瘧者始而



呵欠繼而是冷面青黃身體拘急寒慄鼓頰腰脊俱疼寒去未幾內外皆熱頭疼而渴但欲飲冷嘔惡防悶而不嗜食或內伏寒痰寒從背起冷如掌大瘡之寒熱豈非陰陽二氣互相勝負而作耶邪併於陰則寒邪併於陽則熱陰盛則寒多陽盛則熱熾其寒也湯火不能溫其熱也冰雪不能寒其氣與邪氣交爭病以作邪氣與衛氣相離故汗出乃解而病以休衛氣晝行陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰而內持故發於暮夜或隔日或二日一發或三日乃衛氣行遲爾若內外失守其邪不分陰陽迭將寒熱互起則休作無定時矣

湯氏曰是以外因感受邪氣客於皮膚達於經絡內因停積乳食痰飲漬於臟腑此瘡疾之胚胎也

聖惠曰瘡疾欲解則有汗汗出多則津液減耗又熱乘於臟則生虛燥故渴而欲飲

張秘教曰若病瘡無汗非也

陽衰瘡則有傷寒證見大小便俱赤食瘡必腹膨脹脛脛厚壯熱足冷脉緊主紋紫亦先表解調神而後可下瘡虛生痰其發必有痰證脾脉弱四肢或浮先表解中加痰藥脾寒發瘡則面色青黃四肢冷大小便或自利亦可養胃瀉痰之是瘡背寒面垢頭渴小便赤大便堅者葛散表後五不散方之

### 嬰童驚風歌

瘡疾是非成 陰陽有競爭 早期風府會 嬰發脊脊停  
至速連朝發 來遲間日行 小兒遭遇此 何必問神明

水鑑仙人百日内瘡

瘡是邪風寒熱收 直須術治免成空 常山刻作人形狀

丁釘孩兒生氣官 此金生人金生在世頭釘上錄依此

冷物為瘡

寒熱往來頻 傷脾是病因 連朝發血氣 問曰積精神

瘡瘡無時作 連綿久不除 痿黃羸瘦瘦 蒸瘴骨中居

乳食動皆減 傷筋血不舒 漸喘加乾咳 持上表身軀

反傷於身秋成瘡 開口連朝不少差 解衣去邪須次第

再宜察審自固脾家

常山歌 治嬰孩小兒發瘡瘰癧煩悶

常山

大黃

甘草 炙各一錢

桂心

烏梅 去核各半分

右剉散用水煎未發前服

清脾湯

治嬰孩小兒瘧疾久不瘥者脾胃虛弱形容憔悴

厚朴

薑製炒

烏梅 去核

半夏

良薑

東壁土炒

青皮

去穢炒

草薢

去殼二錢半

甘草

炙二錢

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎未發前服忌生冷油

膩時菓毒物

驅癰飲

治嬰孩小兒瘧疾日久脾虛胃弱

紫蘇

白芷

檳榔

去脂

陳皮

去白

茯苓

去皮

甘草

炙

前胡去蘆各五錢

草菓去心

半夏去心各一兩

右以咀用生薑三片棗一箇去核入烏梅一箇去核同煎不拘時候服

驅癰飲子

治嬰孩小兒調脾胃進乳食退寒熱

人參去蘆

藿香葉

厚朴薑製炒

白朮

白芷

半夏麩

陳皮去白

甘草炙

右以咀用生薑一片棗一箇去核同煎看兒大小食遠服

人參北柴胡湯

治嬰孩小兒周歲以下寒熱

人參去蘆

柴胡去蘆

黃芩炒

半夏麩

甘草炙

地骨皮

右文咀用生薑一尺棗一箇去核同煎食遠服

脾胃宿食不消驚惕不食

人以胃氣爲本飲食不消命將爲中州土也胃受土之氣滋養萬物食入胃脾爲磨化五味以養五臟榮養百骸潤澤四肢其根本也胃氣調和則化消消化脾胃虛冷則宿食不消脾熱生痰涎驚惕不食者心受脾母火能生土當以心藥入脾胃母能令子實脾胃有冷小兒涎多留在兩口角流出而不收潰於頤下名滯頤之疾俗謂之捏破涎滴兒者

小兒滯頤涎流出而潰於頤間也涎者脾之涎脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

脾冷涎流

脾冷流涎唾 經云是滯腦 不宜類下濕 濕久損傷飢  
 小兒滯頤只因傷 清涎流出汚衣裳 此見脾虛寒胃冷  
 遇人却道破涎囊 忽知服藥全無效 夜卧不止又流床  
 好先洗肺調胃脘 溫脾壯健保安康

溫脾丹

丁香

木香

半夏麴各五錢

青皮去穰炒

白朮

乾薑炮各二錢半

右為極細末煉白蜜圓如赤米大用米飲食前服

溫胃散

丁香二錢半

肉豆蔻麴去油半夏麴

白朮

乾薑炮

甘草炙

人參 去蘆皮二錢二分半

右吹咀用生薑三片煮一箇去核同煎食前服

丁香半夏圓 治嬰孩小兒脾冷多涎

丁香

半夏

去穢生薄荷二兩搗碎炒黃

木香

各三錢

青皮

去穢炒

白朮

乾薑

炮各一錢半

右爲極細末煮麴糊圓如黍米大用米飲食遠服

金朱丹

治嬰孩小兒涎多乳食不下涎流不出口者名脾熱

金箔

十片

朱砂

水飛

半夏

去穢湯洗

天南星

牛膽製各五錢

石膏

茯苓

去皮各二錢半

右爲極細末生薑汁圓用人參去蘆煎湯食遠服



胃氣不和

面黃白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾

胃冷虛

面黃白色瘦弱腹痛不思乳食當補脾

脾胃不和受驚

小兒昏睡傷風熱傷食癰痘皆相似未能變認可疎風退熱  
便不可服驚藥峻下忌傷元氣人參羌活散惺惺散小柴胡湯  
加羌活去蘆防風去蘆又枳殼去穰麵麩炒生薑棗去核同煎  
服和解散不致誤也惟傷食大便酸臭食物不化腹痛有吐瀉  
之證

驚瀉不止青黃色

緊急收中睛轉黑

但看指紋青脈現

次進觀音散調服

此證紅綿表裏除

解表清心真妙訣

醫士須用氣和脾

只依仙方勿有別

### 脾氣虛實

人以胃氣為本惟治病亦然胃氣有虛有實虛則有嘔吐不食實則有痞滿內熱之證虛者益之實者損之欲得其平則可矣又不可闕糞在酌量但以服之夫是之為平胃

心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入於脾胃藥之中庶幾兩得古人進食方劑多用益智者此也

益智

去殼

石膏蒲

茯苓

去皮

蓮肉

去心

橘紅

去白

縮砂

去殼

半夏

木香

厚朴

薑製炒各二錢

甘草 炙一錢一字

右剉散用生薑三片棗一箇去核同煎不飢飽服

### 嘔乳糞青

小兒嘔乳糞青色在胎之時母取冷過度冷氣入於胞胎之中  
生兒之後悲啼未定承氣便與乳使乳冷氣蘊蓄於腹內久而  
不散傷於脾胃輕則嘔吐糞青重則腹中氣響逆氣痰潮以致  
難愈可服溫胃藥不可妄作驚治

小兒驚泄瀉則目白如淡墨下糞青黃㗎哇微渴若見心喘躁  
狂熱不止皆為死候不可治

氣弱更因驚 睛如淡黑形 乳多隨糞下 瀉出夾黃青  
㗎哇常微渴 寒溫 晚臨 心脾熱喘燥 轉見病相深

蟲痛

夫蟲者由兒三歲之後甘肥不節生冷過度或食生粟炙肉魚生皆致生蟲其蟲因臟腑虛弱而動或食甘肥而動或胃冷而動或胃熱而動動則往來上下腹疼攻心疳痛叫哭仰身擗手心神悶亂涎吐沫或吐清水飲食不成肌膚沉沉默默其蟲不療傷心害人保生云蛔蟲九蟲之數人腹中皆有之小兒失亂而哺早或食甜過多胃虛蟲動今見腹動惡心口吐清水腹上青筋是其證也

巢氏云蛔蟲九蟲之內一蟲也長尺亦有長五六寸者或因臟腑虛弱而動或食甘肥而動其動則腹中痛發作種聚行來上下痛有休止亦攻心痛口多吐涎及清水胃傷心者死小兒有

蟲於月初四初五間五更服至日午前蟲下以和脾胃藥一二服調理或有蟲痛發作似癇但目不斜手不搖撮惟只心痛也其候哭啼俛仰坐卧不安自按心腹時時大叫面無正色或青或黃唇慢而白目無睛光口吐涎沫此為蟲痛還蟲圓 治嬰孩小兒蟲動腹痛啼叫口吐涎沫

檳榔主磨

蕪荑去皮

雷丸

定粉

鷄虱炒各半錢

右為極細末川棟根煎湯煮麵糊圓如黍米大用史君子去殼煎湯食前服

千金方云蟲攻下部燒艾煙薰

安蟲散 治嬰孩小兒蟲咬心痛來去不定不思乳食

霍亂

檳榔

胡椒

川棟子根

各二錢

半生半取

蝦

若為極細末用米飲調化食前服如有小蟲可化為水大蟲  
白下片初間服

霍亂

霍亂者陰陽二氣相干氣亂於腸胃之間腸陽陰而不降陰無  
陽而不升邪正相干中脘節閉結滯必中卒然吐瀉成霍亂先  
心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則瀉重者脾受則邪水  
來勝土也

小兒內因脾胃虛弱乳哺停積外感風寒暑邪正交爭冷熱不  
同藥有寒溫各異脾虛則吐胃虛則瀉脾胃俱虛吐瀉並作暴

吐暴瀉津液驟亡失其所養甚則轉筋入腹而死

經曰濕霍亂死者少乾霍亂死者多

治法必先定吐安胃爲先次隨證止瀉丁香圓四君子湯加丁香陳皮半夏生薑棗土核同煎食遠服安胃止吐伏暑熱者五苓散用生薑煎湯調化食前服感寒者理中湯加丁香乳哺停滯者參朮子微利後服加味四君子湯

### 乾霍亂

乾霍亂者忽然心腹脹滿絞痛欲吐不吐似瀉不瀉痰壅腹脹傾刻之間便致悶絕所傷之物因吐瀉盡則生若上不得吐下不得泄瀉壅閉正氣關隔陰陽燥投喘脹霍亂氣息小者危治法先疎利爲先服紫圓子鶴頂丹得吐者生不得吐者死

鹽湯吐法

調鹽湯一小鍾盛熱飲之手拈鵝翎於喉中導引只吐令三飲  
三吐方可不可得吐便止此方一死九生

鹽煎法

鹽一兩釜內炒大熱紙包用縮獲刺胸前并肚腹令熱氣入口  
即醒又製背灸中脘丹田灸

人病怕逢乾霍亂

濃心鹽湯乘熱灌

莫言畧通便到休

三吐方知停積散

却加木瓜尤良好

直須吐盡保身康

急早便服蘇合香

再投消積圓子良

藥教連灌醫急救

然後調脾胃不妨

先認青黃色兩般

定知風熱在脾間

怕人疑直眼不合



口是心中有毒延

胃逆更宜忌搖起

過熱酒知命莫延

熱在胃中多燥渴有熱莫飲水

常溫厚白口須乾 若還舌上生黃